



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:


- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

B 450052

DUPL



THE GIFT OF
PROF. ALEXANDER ZIWET

QA
31
.E88
S731
1897

1237 1

1.6

Alexander Ziwet

CODEx LEIDENSIS

399,1.

EUCLIDIS ELEMENTA

EX INTERPRETATIONE AL-HADSCHDSCHADSCHII

CUM COMMENTARIIS AL-NARIZII.

ARABICE ET LATINE EDIDERUNT

NOTISQUE INSTRUXERUNT

R. O. BESTHORN ET J. L. HEIBERG.

PARTIS II FASCICULUS II



HAUNIAE MCMV.

IN LIBRARIA GYLDENDALIANA

G. B. N. F

TYPIS EXCUDERUNT NIELSEN ET LYDICHE.

(AXEL SIMMELKJER).

المقالة الثالثة من كتاب اوقليدس في الاصول

بسم الله الرحمن الرحيم

قال اوقليدس الدوائر المتساوية هي التي اقطارها متساوية والخطوط التي تخرج من مراكزها الى الخطوط المحيطة بها متساوية قال ايضاً هذا القول مبين لانه اذا كانت الاقطار متساوية فان الخطوط الخارجة من المراكز الى المحيطات تكون متساوية لان كل واحد من تلك الخطوط نصف القطر وظاهر لنا انه اذا كانت الخطوط المستقيمة الخارجة من المراكز الى المحيطات متساوية فان الدوائر تكون متساوية لان رسوم الدوائر انما يكون بالبعد الذي بين المراكز والمحيطات الذي هو نصف الاقطار . قال اوقليدس الخط المستقيم المماس للدائرة هو الذي اذا لامس الدائرة واخرج في الجهتين جميعاً لم يقطع الدائرة والدوائر التي يماس بعضها بعضاً هي التي اذا ماس بعضها بعضاً لم تتقاطع . الخطوط المستقيمة المساوية البعد عن المركز هي التي الاعمدة الخارجة من المركز اليها متساوية واعظمها بعداً عن المركز هو الذي العمود الخارج اليه اعظم .¹⁾

Libor tertius Euclidis de elementis.

In nomine Dei misericordis miseratoris.

Euclides dixit: Aequales inter se circuli sunt, quorum diametri inter se aequales sunt, quorumque a centris lineae ad lineas eos comprehendentes ductae inter se sunt aequales.

Hero dixit: Hoc dictum manifestum est. Si enim diametri inter se aequales sunt, lineae a centris ad ambitus ductae inter se aequales erunt, quoniam unaquaeque earum linearum dimidia est diametri. Et hoc quoque nobis manifestum est, si lineae rectae a centris ad ambitus ductae inter se aequales sint, etiam circulos inter se aequales esse, quia circuli non describuntur nisi distantia inter centra et ambitus, quae est dimidia diametri.

Euclides dixit: Linea recta circulum contingens linea est, quae circulum tangens in utramque partem simul producta circulum non secat.

Circuli inter se contingentes circuli sunt, qui inter se tangentes inter se non secant.

Lineae rectae eodem spatio a centro distantes eae sunt, ad quas perpendiculares a centro ductae inter se aequales sunt. Maiore spatio a centro ea distat, ad quam perpendicularis ducta maior est.¹⁾

¹⁾ In margine est: هذه الخطوط يراد بها الاوتار لا غير His lineis nihil aliud ac chordas significat.

قال إيرُن ان الرياضى اراد ان يبين البعد الذى بين
المراكز وبين الخطوط المستقيمة المساسة لذلك ذكر الاعمدة وذلك
انه قد يُمكن ان يخرج من كل نقطة الى كل خط خطوطٌ
كثيرة فاما البعد الذى بين النقطة وبين الخط فهو العمود
الخارج من تلك النقطة الى ذلك الخط . قال اوقليدس وقطعة
الدائرة هى الشكل الذى يحيط به خطٌ مستقيم وقطعة قوسٍ من
محيط الدائرة . وزاوية القطعة هى التى اذا علم على قوس القطعة
نقطة ما وأخرج منها الى نهايتى قاعدة القطعة خطان مستقيمان
احاطا بها واذا كان الخطان المحيطان بالزاوية يحيطان بقوس
فان تلك الدائرة [الزاوية scr.] تُسمى المركبة على تلك القوس . 34 r.
قطاع الدائرة هو الشكل الذى يحيط به الخطان المستقيمان
الحيطان بالزاوية¹⁾ والقوس التى الزاوية متركبة عليها¹⁾ قال إيرُن
يعنى بالقوس التى توتر الزاوية وانواع القطاع اثنان فمنها ما يكون
رؤسها على المراكز ومنها ما يكون رؤسها على المحيطات فاما التى
رؤسها [لا كاذات] على المراكز ولا على المحيطات فانها ليست
بقطاع لكنها تُشابه القطاع قال اوقليدس قطع [الدوائر] المتشابهة
هى التى [زاوياها] متساوية او التى تكون الزوايا التى تقع فيها
متساوية . قال [ايرُن] قد ينبغى ان نعلم انه اذا كانت قطع الدوائر
متشابهة فان الزوايا المرسومة فيها متساوية و[ند ؟] ذلك اذا
كانت الزوايا التى تقع فى قطع الدوائر متساوية فان تلك القطع
متشابهة وانواع الاشكال هى هذه الدائرة وقطع الدائرة

¹⁾⁻¹⁾ Haec uerba in margine adiiciuntur.

Hero dixit: Geometra¹⁾ distantiam inter centra et lineas rectas contingentes demonstrare uult ideoque perpendiculares commemorauit, quia fieri potest, ut ab unoquoque puncto ad unamquamque lineam²⁾ multae lineae ducantur, sed distantia inter punctum et lineam est perpendicularis a puncto ad lineam ducta.³⁾

Euclides dixit: Segmentum circuli figura est, quam linea recta et pars arcus ex ambitu circuli comprehendunt.

Angulus segmenti dicitur, si a puncto aliquo in arcu segmenti sumpto ad duos terminos basis segmenti duae rectae eam comprehendentes ducuntur.

Si duae lineae angulum comprehendentes arcum comprehendunt, hic circulus [scr. angulus⁴⁾] dicitur in eo constructus.

Sector circuli figura est, quae comprehenditur duabus lineis rectis angulum comprehendentibus et arcu, in quo angulus positus est.

Hero dixit: Significat arcum angulo oppositum.⁵⁾ Sectorum autem duae species sunt, uel quorum uertices in centro, uel quorum uertices in ambitu sunt. Quorum autem uertices neque in centro neque in ambitu sunt, non sunt sectores, sed sectori modo similes.

Euclides dixit: Segmenta circulorum inter se similia sunt, quorum anguli inter se aequales sunt, uel in quae anguli aequales cadunt.

Hero dixit: Oportet nos scire, si segmenta circuli inter se similia sint, angulos in iis constructos inter se aequales esse. Et rursus, si anguli, qui in segmenta circuli cadunt, inter se aequales sunt, segmenta inter se similia erunt.

¹⁾ Gher. Crem. (p. 111): »Uoluit Euclides demonstrare«.

²⁾ Gher. Crem. (p. 111—12): »ad unumquodque punctum«.

³⁾ Apud Gher. Crem. (p. 112) Hero hanc rem uberius tractat.

⁴⁾ Ut apud Gher. Crem.

⁵⁾ Apud Gher. Crem. (p. 112) scholium Heronis cum uerbis Euclidis confunditur. Uerba, quae sunt: »Hero dixit«, ibi omissa sunt.

والمُحدبة والهِلالية أما الدائرة فهي الشكل الذى قد خصناه في الاشكال التى تحيط بها الخطوط المستقيمة وأما قطعة الدائرة فهي الشكل الذى يحيط به خط مستقيم وقوس من محيط الدائرة وإذا تقاطعت دائرتان فإن القطعة المشتركة لهما تسمى المُحدبة والقطعتان الباقيتان تُسمى كل واحدة منهما هِلالية . . . فتمت المصادرة

(١) إذا جاز خط مستقيم على دائرة يماسها من خارجها ولا يقطع منها شيئا فإنه يُقال له المماس للدائرة . . . وإذا كانت الدوائر تُماس بعضها بعضاً ولا تقطع واحدة منها الاخرى فإنه يُقال له التماس . . . وإذا كانت في الدوائر خطوط فكانت الاعمدة التى تخرج اليها من المركز متساوية فإن ابعاد الخطوط من المركز سواء وابعدها هو الذى عموده اطول . . . والقطعة من الدائرة يحيط بها خط مستقيم يُقال له الوتر وطائفة من الخط المحيط يُقال لها القوس وزاوية القطعة يحيط بها خط الوتر وخط القوس . . . وإذا تعلّمت نقطة على خط القوس وأخرج منها خطان الى طرفي الوتر فصار الوتر قاعدةً لهما فإن الزاوية التى على النقطة والخطان يُحيطان بها مُركبة على القوس والشكل الذى يُقال له القطاع هو الذى يحيط به خطان يخرجان من المركز الى الخط المحيط والقوس الذى بينهما والزاوية التى يحيط بها الخطان مُركبة على مركز الدائرة وقطع الدوائر اذا كانت زاويتا كل قطعة مساويتين لزاويتي القطعة الاخرى فالقطاع متساوية واذا كانت القطاع متساوية فإن زاويتي كل قطعة مساويتان لزاويتي القطعة الاخرى . . . واذا كانت زاويا

Species*) figurarum sunt: circulus, segmenta circuli, conuexum, lunare.

Circulus est figura, quam iam inter figuras, quas lineae rectae comprehendunt, definiuimus.

Segmentum circuli figura est, quam linea recta et arcus ex ambitu circuli comprehendunt.

Si duo circuli inter se secant, segmentum iis commune conuexum dicitur, duo autem segmenta, quae relinquuntur, lunaria.

Finis postulorum.

Si¹⁾ linea recta circulum tangit eum modo extrinsecus adtingens nullamque eius partem secans, contingens circuli uocatur.

Si circuli inter se tangentes non secant inter se, circuli inter se contingentes uocantur.

Si perpendiculares a centro ad lineas circuli ductae inter se aequales sunt, linearum a centro distantiae aequales erunt; et maior eius erit distantia, cuius perpendicularis longior est.

Segmentum circuli comprehendunt linea recta, quae chorda uocatur, et pars ambitus circuli, quae arcus uocatur. Angulus segmenti linea chordae et linea arcus comprehenditur.**)

Si punctum in linea arcus sumitur, et ab eo ad duos terminos chordae duae lineae ducuntur, chorda basis earum est, et angulus ad punctum positus duabus lineis comprehensus in arcu constructus est.

Figura, quae sector uocatur, duabus lineis a centro ad ambitum ductis comprehenditur et arcu inter eas posito, angulus autem eius est, quem duae illae lineae comprehendunt in centro circuli constructum.

Si in segmentis duo anguli alterius duobus angulis alterius aequales sunt, segmenta inter se similia erunt. Sin autem

*) Hinc noua series definitionum incipit ab Arabe addita.

¹⁾ Uerba, quae sequuntur usque ad prop. I, eadem manu, sed rubro atramento scripta, postea, nisi fallor, inserta sunt.

**) Est Euclidis def. 7, supra omissa.

القطع متساويةً فالقطع متساويةً وإذا كانت القطع متساوية فالزاويا
متساوية . . ع

الشكل الأول من المقالة الثالثة

نريد ان نبين كيف نجد مركز دائرة مفروضة فننزل انها
دائرة أب ونريد ان نبين كيف نجد مركزها فنخرج فيها
وتر جد حيث شئنا من الدائرة ونقسمه بنصفين على نقطة ه
كما بينا قسمة تلك ببرهان يب من ا ونقيم على نقطة ه عمودا
ونخرجه في كلتي الجهتين حتى ينتهي طرفاه الى محيط الدائرة
كما بينا اخراجه ببرهان يا من ا وليكن خط أب ثم نقسم
خط أب بنصفين على نقطة ح واقول ان نقطة ح مركز الدائرة
وانه لا يمكن ان يكون غيرها مركزاً فان امكن ان يكون غير
نقطة ح¹⁾ هي المركز فليكن مركزها نقطة ط²⁾ ونخرج خطوط ط د
ط ه ط ج فلان خط ج ه مثل خط ه د فانا اذا اخذنا خط ه ط
مشاركاً يكون خطا ج ه ه ط مثل خطي د ه ه ط ولان نقطة ط
رُسمت على انها مركز الدائرة يجب ان يكون خط ط ج مثل خط ط د
فببرهان ح من ا فان زاوية ج ه ط مساويةً لزاوية د ه ط واذا قام خط
مستقيم على خط مستقيم فكانت الزاويتان اللتان عن جنبتيه
متساويتين فان الخط القائم عمود عليه وكل واحدة من الزاويتين

1) Verba quae sunt ح نقطة غير نقطة ح paene prorsus euanuerunt
et in imo margine recentiore manu repetuntur.


2) Verba quae sunt ط نقطة in margine adiecta.

segmenta inter se similia sunt, duo anguli alterius duobus angulis alterius aequales erunt. Si rursus anguli in segmentis constructi inter se aequales sunt, segmenta inter se similia erunt, et si segmenta inter se similia sunt, anguli inter se aequales erunt.

Propositio I libri tertii.

Demonstrare uolumus, quo modo centrum dati circuli inueniamus.

Supponimus circulum AB ; demonstrare uolumus, quo modo centrum eius inueniamus. In circulo quamlibet chordam GD ducimus eamque ex I, 12 (scr. 10) in puncto E in duas partes aequales diuidimus. In puncto E perpendicularem erigimus ex I, 11 eamque ad utramque partem producimus, donec uterque eius terminus



ad ambitum circuli perueniat, sitque linea AB . Deinde lineam AB in puncto H in duas partes aequales diuidimus. Dico, punctum H esse centrum circuli.

Neque enim fieri potest, ut aliud punctum centrum sit.

Si enim fieri potest, ut aliud punctum ac H centrum sit, centrum eius sit punctum Θ . Lineas ΘD , ΘE , ΘG ducimus. Quoniam linea GE lineae ED aequalis est, linea $E\Theta$ communi sumpta duae lineae GE , $E\Theta$ duabus lineis DE , $E\Theta$ aequales erunt. Puncto autem Θ ita sumpto, ut sit centrum circuli, fieri non potest, quin linea ΘG lineae ΘD aequalis sit; quare ex I, 8 angulus $GE\Theta$ angulo $DE\Theta$ aequalis erit, et linea recta super rectam erecta duo anguli ad utramque eius partem positi inter se aequales sunt; itaque erecta ad alteram perpendicularis erit, et uterque angulus rectus. Ergo angulus $GE\Theta$ rectus erit. Sed

قائمة فزاوية جهـط اذًا قائمة لكن زاوية جهـح قد تبين انها هي القائمة ' [فزا] وية جهـط الصغرى مثل زاوية جهـح العظمى هذا خلف لا يمكن فليست نقطة ط اذًا بمركز الدائرة وكذلك سائر النقط التي تفرض في الدائرة حيث فرضت منها غير ممكن ان تكون مركزًا للدائرة سوى نقطة ح معما قد تبين من وجودنا لمركز الدائرة قد تبين ايضا ان كل وترين يقسم احدهما الآخر بنصفين وعلى زوايا قائمة فان عليه يكون مركز الدائرة وذلك ما اردنا ان نبين .
تبين انه لا يكون وتران في دائرة يقطع احدهما الآخر بنصفين على زاوية قائمة الا وهو يجوز على مركز الدائرة .¹⁾

الشكل الثاني من المقالة الثالثة

اذا فرض على محيط دائرة نقطتان كيف ما وقعتا ووصل بينهما بخط مستقيم فان الخط المستقيم الذى يصل بين النقطتين يقع داخل الدائرة مثالة انا نفرض على دائرة اب نقطتي جـد ونُخرج خط جـد مستقيماً فاقول انه وقع داخل دائرة اب برهانه انه غير ممكن ان يقع خارجاً عن الدائرة فان امكن فليقع على مثال خط جهـد ونطلب مركز الدائرة بحسب برهان الشكل الاول¹⁾ من هذه المقالة¹⁾ وننزل انها نقطة ز ونصل بين نقطتي جـز ونقطتي زـد ونُخرج من نقطة ز الى محيط دائرة اب خطاً مستقيماً كيف ما وقع وننزل انه خط زب وننزل انا قد انفذناه الى نقطة هـ فان كان كما انزلنا ان خط جهـد مستقيم فمن البين ان مثلث

¹⁻¹⁾ Haec uerba atramento rubro scripta sunt.

iam demonstratum est, angulum GEH rectum esse; itaque minor angulus $GE\Theta$ maiori angulo GEH aequalis erit; quod absurdum est neque fieri potest. Quare punctum Θ non est centrum circuli. Eadem ratione de omnibus punctis in circulo suppositis demonstratur, fieri non posse, ut centra circuli esse supponantur, praeter unum punctum H .

Hac nostra de centro circuli demonstratione simul demonstratum est, si chorda aliam in duas partes aequales et ad rectos angulos secet, in ea centrum circuli positum esse. Q. n. e. d.


Demonstratum est, fieri non posse, ut in circulo chorda chordam in duas partes aequales et ad rectos angulos secans per centrum circuli non transeat.

Propositio II libri tertii.

Si in ambitu circuli duo quaelibet puncta data erunt, quae linea recta coniunguntur, linea recta, quae duo illa puncta coniungit, intra circulum cadet.

Exemplificatio. In circulo AB duobus punctis G, D datis lineam GD rectam ducimus. Dico, eam intra circulum AB cadere.

Demonstratio. Fieri enim non potest, ut extra cadat. Si fieri potest, ita cadat, ut linea GED . Sumpto igitur ex prima propositione huius libri¹⁾ centro circuli supponimus esse punctum Z . Punctis G, Z et punctis Z, D coniunctis a puncto Z ad ambitum circuli AB lineam quamlibet rectam ducimus, quam lineam ZB esse supponimus, supponimusque, nos eam ad



¹⁾ Supra scriptum: $\text{B} - \text{I} \text{ c: II, 1!}$

جهدز متساوي الساقين لان ساق جز مساو لساق زد لانهما
 خرجا من المركز الى المحيط فزاوية زجه مثل زاوية زده وبحسب يو
 من ا فان زاوية زهـج الخارجة من مثلث زده اعظم من زاوية زده
 الداخلة فزاوية زهـج اذا اعظم من زاوية زجه لكن بحسب برهان
 يط من ا يكون ضلع زج الموتر للزاوية العظمى اعظم من ضلع
 هـز الموتر للزاوية الصغرى لكن خط زج مساو لخط زب فخط زب اذا
 اعظم من خط زه الاصغر اعظم من الاعظم هذا خلف غير ممكن
 وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل الثالث من المقالة الثالثة

اذا اجيز على مركز دائرة خط مستقيم فقطع خطا اخر مستقيما
 ليس على المركز بنصفين فانه يقطع على زوايا قائمة وان قطع
 على زوايا قائمة فانه يقطعه بنصفين مثاله ان دائرة اب مركزها ^{35 r.}
 نقطة ز وقد اجيز على ز خط اب وقد قطع خط جد على نقطة هـ
 فاقول ان كان قطع بنصفين فانه يقطع على زوايا قائمة وان
 قطع على (على) زوايا قائمة فانه يقطع بنصفين برهانه انا نزل
 اولاً انه قطع بنصفين على نقطة هـ ونخرج [من نقطة ز المركز خطي
 زج زد فلان خط جه مثل خط هـد وناخذ هـز مشتركاً فان خطي
 جه هـز مثل خطي ده هـز [فقاعدة جز مثل قاعدة دز لانهما خرجا
 من المركز الى المحيط فبحسب برهان ح من ا تصير زاوية جهز
 [مساوية لزاوية دهز وبحسب مصادرة ا اذا قام خط مستقيم على
 خط مستقيم فكانت الزاويتان الدائمتان عان جنبتي الخط القائم


punctum E produxisse. Iam si linea GED , ut supposuimus, recta est, manifestum est, triangulum $GEDZ$ aequicrurium esse; nam crus GZ cruri ZD aequale, quoniam a centro ad ambitum ducta sunt. Ergo $\angle ZGE = ZDE$. Sed ex I, 16 angulus ZEG exterior trianguli ZDE maior est angulo ZDE interiore; itaque angulus ZEG maior erit angulo ZGE . Et ex I, 19 latus ZG sub maiore angulo subtensum latere EZ sub minore angulo subtenso maius erit. Uerum linea ZG lineae ZB aequalis; ergo linea ZB maior erit linea ZE , minor maiore; quod absurdum est neque fieri potest. Q. n. e. d.

Propositio III libri tertii.

Si linea recta per centrum circuli ita ducitur, ut aliam lineam rectam non per centrum ductam in duas partes aequales secet, eam ad angulos rectos secat. Et si eam ad angulos rectos secat, eam in duas partes aequales secat.

Exemplificatio. Circuli AB centrum est Z , et per Z linea AB ducta lineam GD in puncto E secat. Dico, illam, si eam in duas partes aequales secet, ad angulos rectos eam secare, et, si eam ad angulos rectos secet, in duas partes aequales secare.

Demonstratio. Primum supponimus, illam eam in puncto E in duas partes aequales secare. A puncto Z , quod centrum est, duas lineas ZG , ZD ducimus. Quoniam $GE = ED$, et EZ communis est, duae lineae GE , EZ duabus lineis DE , EZ aequales erunt. Basis autem GZ basi DZ aequalis est, quoniam a centro ad ambitum ductae sunt; quare ex I, 8 angulus GEZ angulo DEZ aequalis est. Uerum si linea recta super lineam rectam ita erecta est, ut duo anguli ad utramque partem lineae erectae positi inter se aequales sint, ex postulato 1 (scr. definitione 10) uterque angulus rectus dicitur;



متساويتين فان كل واحدة من الزاويتين يُقال لها قائمة فزاويتنا
 جـ هـ ز كل واحد [من هـ] قائمة فقد تبين ان خط ا ب لما قطع
 خط جـ د بنصفين قطع على زاويا قائمة ونزل ايضا ان خط ا ب
 قد قطع خط جـ د على نقطة هـ على زاويا قائمة فاقول انه قد قطع
 بنصفين برهان ان مثلث جـ د متساوي الساقين ساق ز د مثل
 ساق ز هـ لانهما خرجا من المركز الى المحيط فحسب برهان هـ
 من ا فان زاوية ز جـ د مساوية لزاوية ز د جـ وقد كنا بينا ان زاوية
 جـ هـ القائمة مثل زاوية د هـ ز فزاويتنا ز هـ جـ مساويتان لزاويتي ز د هـ
 ز هـ فحسب برهان لب من ا تبقى زاوية جـ هـ مساوية لزاوية د هـ
 فاذا اخذنا خط هـ مشتركاً فاته يكون ضلعا جـ ز هـ مساويين
 لضلعي د ز هـ وزاوية جـ هـ ز قائمة تبين انها مثل زاوية د هـ فحسب
 برهان د من ا تكون قاعدة جـ هـ مثل قاعدة د هـ فقد تبين ان خط
 ا ب قد قطع خط جـ د بنصفين وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل الرابع من المقالة الثالثة

اذا تقاطع خطان في دائرة على غير المركز فانهما لا يتقاطعان
 على انصافهما مثاله ان خطي جـ د هـ قد تقاطعا في دائرة ا ب على
 نقطة ح وليس واحداً منهما يجوز على المركز فاقول انهما لم يتقاطعا
 على انصافهما وانه غير ممكن ذلك فان امكن ان يجوز على غير
 المركز ويقطع احدهما الاخر بنصفين فليتقاطعا على انصافهما
 ولنزل ان موضع التقاطع نقطة ح ونستخرج مركز دائرة ا ب كما
 بين ذلك برهان ا من جـ وليكن نقطة ط ونصل بين نقطتي ط ح

itaque uterque angulus GEZ , DEZ rectus est. Ergo iam demonstratum est, lineam AB lineam GD in duas partes aequales secantem eam ad angulos rectos secare.

Rursus supponimus, lineam AB lineam GD in puncto E ad angulos rectos secare. Dico, eandem eam in duas partes aequales secare.

Demonstratio. Triangulus GZD aequicrurius est; crus enim ZD cruri ZG aequale, quoniam utrumque a centro ad ambitum ductum est; quare ex I, 5 $\angle ZGD = \angle ZDG$. Iam autem demonstrauius, angulum rectum GEZ angulo DEZ aequalem esse; itaque duo anguli ZGE , ZEG duobus angulis ZDE , ZED aequales sunt. Relinquitur igitur ex I, 32 $\angle GZE = \angle DZE$. Et linea ZE communi sumpta duo latera GZ , ZE duobus lateribus DZ , ZE aequalia erunt. Iam autem demonstratum est, angulum GZE angulo DZE aequalem esse; itaque ex I, 4 basis GE basi DE aequalis erit. Ergo demonstratum est, lineam AB lineam GD in duas partes aequales secare. Q. n. e. d.


Propositio IV libri tertii.

Si in circulo duae lineae inter se secant non per centrum ductae, in duas partes aequales inter se non secant.

Exemplificatio. Duae lineae GD , EZ in puncto H in circulo AB inter se secant non per centrum ductae. Dico, eas in duas partes aequales inter se non secare, nec hoc fieri posse.

Nam si fieri posset, ut, etsi per centrum ductae non sint, altera alteram in duas partes aequales secant, secant inter se in duas partes aequales, et supponamus, locum, quo inter se secant, esse punctum H .

Centrum circuli ex III, 1 sumimus, quod sit punctum Θ , et inter duo puncta Θ , H lineam rectam ΘH



بخط مستقيم فمن اجل انه قد خرج من نقطة ط التي هي المركز
خط ط ح المستقيم وقسم خط جد بنصفين فبحسب برهان ج من
ج فان خط ط ح عمود على خط جد فزاوية د ح ط اذًا قائمة وايضا
فان خط ط ح عمود على (من المركز الى) خط ز ه وقسمه بنصفين
على نقطة ح فبحسب برهان ج من ج فان خط ط ح عمود على
خط ه ز فزاوية ز ح ط اذن قائمة وقد تبين ان زاوية د ح ط ايضا
قائمة فزاوية ز ح ط اذن مساوية لزاوية د ح ط العظمى مثل الصغرى
هذا خلف فقد تبين ان خطي جد ه ز لا يتقاطعان على انصافهما
على غير المركز فقد بقي ان يكون تقاطعهما على المركز لان
الخطوط الخارجة من المركز الى محيط الدائرة متساوية وذلك ما
اردنا ان نبين

35 u.

الشكل الخامس من المقالة الثالثة

اذا تماسّت دائرتان فانهما لا تكونان على مركز [واحد] مثاله
ان دائرتي ا ب ا ج قد تماسّتا على نقطة ا فاقول انهما لا تكونان على
مركز واحد . برهانه ان امكن ان تكونا على مركز واحد فلننزل انهما
على مركز د ونخرج خط ا د ونخرج من نقطة د خطا الى دائرة ا ب
كيف اتفق وليكن خط د ب فمن اجل ان نقطة د مركز لدائرة ا ج
فمن البين ان خط ا د مساو لخط [د] ج وايضا فلان نقطة د مركز
لدائرة ا ب وقد خرج منها خطان الى المحيط وهما خطا ا د [د ب]
فخط ا د اذن مساو لخط د ج والمساوية لشيء واحد فهي متساوية
فخط د ب اذن مساو لخط د ج الاعظم مساو للصغر هذا خلف


ducimus. Quoniam linea recta ΘH a puncto Θ , quod centrum est, ducta lineam GD in duas partes aequales secat, ex III, 3 linea ΘH ad lineam GD perpendicularis erit; itaque angulus $DH\Theta$ rectus erit. Rursus si linea ΘH ad lineam ZE ducta eam in duas partes aequales in puncto H secat, linea ΘH ex III, 3 ad lineam EZ perpendicularis erit; itaque angulus $ZH\Theta$ rectus erit. Sed iam demonstratum est, etiam angulum $DH\Theta$ rectum esse. Ergo angulus $ZH\Theta$ angulo $DH\Theta$ aequalis erit, maior minori; quod absurdum est. Demonstratum igitur est, duas lineas GD , EZ inter se in duas partes aequales non secare nisi in centro. Relinquitur igitur, locum, in quo se secant, in centro esse, quoniam (scr. et?) lineae a centro ad ambitum circuli ductae inter se aequales sunt. Q. n. e. d.

Propositio V libri tertii.

Duo circuli inter se contingentes idem centrum non habebunt.

Exemplificatio. Duo circuli AB , AG in puncto A inter se contingunt. Dico, eos idem centrum non habere.

Demonstratio. Nam si fieri potest, ut idem habeant centrum, supponamus, eos centrum D habere. Lineam AD ducimus. Iam si linea DB a puncto D ad circulum AB utcumque ducitur, quoniam punctum D centrum est circuli AG , manifestum erit, lineam AD lineae DG aequalem esse.



Rursus quoniam punctum D centrum est circuli AB , et ab eo ad ambitum duae lineae AD , DB ductae sunt, linea AD lineae DG aequalis erit. Quae autem eidem aequalia sunt, inter se aequalia sunt. Ergo linea DB lineae DG aequalis erit, maior minori. Quod absurdum est neque fieri potest. Q. n. e. d.

غير ممكن وذلك ما اردنا ان نبين قال ايرون انما قدمنا المتباسة
على المتقاطعة لان المتباسة قبل التقاطع .:

الشكل السادس من المقالة الثالثة

اذا تقاطعت دائرتان فانهما ليستا على مركز واحد مثالة ان
دائرتي ارج ارج تقاطعتا على نقطتي ارج فاقول ان دائرتي ارج ارج
ليستا على مركز واحد برهانه انه ان امكن فليكن مركزها واحدا
ونزل انه نقطة ه ونخرج من نقطة ه الى نقطة ا خط ه ا فبين البتين
انه قد انتهى الى محيط الدائرتين جميعا ونخرج خط ه د الى محيط
دائرة ارج كيف اتفق اخراجه فبين اجل ان نقطة ه مركز دائرة ارج
يكون خط ه ا مساويا لخط ه ز وايضا فبين اجل ان نقطة ه مركز
لدائرة ارج يكون خط ه ا مساويا لخط ه د وقد تبين ان خط ه ا
مساو لخط ه ز والمساوية لشي واحد فهي متساوية خط ه د اذن
مساو لخط ه ز الاعظم مثل الاصغر هذا خلف غير ممكن وذلك ما
اردنا ان نبين

الشكل السابع من المقالة الثالثة


اذا فرض على قطر دائرة علامة ما ليست بمركز الدائرة وأخرج
من تلك العلامة الى محيط الدائرة خطوط مستقيمة فان اعظم
الخطوط الذي عليه مركز الدائرة واصغرها باقى القطر واما الخطوط
الاخرى فما قَرَبَ منها من المركز كان اعظم مما بَعَدَ منها عنه
وخطان فقط عن جنبتي القطر متساويان مثاله ان دائرة ا ب ج د

Hero dixit: Contactum ante sectionem posuimus, quia contactus sectione prior est^{1-*)})

Propositio VI libri tertii.

Si duo circuli inter se secant, idem centrum non habebunt.

Exemplificatio. Duo circuli AZG , ADG inter se secant in duobus punctis A , G . Dico, duos circulos AZG , ADG idem centrum non habere.



Demonstratio. Si fieri potest, idem habeant centrum, quod punctum E esse supponimus. A puncto E ad punctum A linea EA ducta manifestum est, eam in ambitu utriusque circuli simul desinere. Iam si linea ED utcumque ad ambitum circuli ADG ducitur, quoniam punctum E centrum est circuli AZG , linea EA lineae EZ aequalis erit. Rursus quoniam punctum E centrum est circuli ADG , linea EA lineae ED aequalis erit. Demonstrauimus autem, lineam EA lineae EZ aequalem esse. Quae autem eidem aequalia sunt, inter se aequalia sunt. Ergo linea ED lineae EZ aequalis erit, maior minori. Quod absurdum est neque fieri potest. Q. n. e. d.

Propositio VII libri tertii.


Si in diametro circuli punctum aliquod datum est, quod centrum circuli non est, et ab hoc puncto ad ambitum circuli lineae rectae ductae sunt, maxima linea ea erit, in qua est centrum circuli, minima autem reliqua pars diametri; ceterarum autem quae centro propior est, maior est remotiore, et duae solae lineae ad utramque partem centri positae inter se aequales sunt.

¹⁾ Hoc scholion Heronis in uersione Gherardi Cremonensis deest.

^{*)} Apud Euclidem h. l. prop. VI ante hanc propositionem V collocatur; ordinem igitur propositionum inuertit ipse Hero.

قطرها $\overline{ج د}$ ونفرض عليه نقطة لا تكون على المركز ولتكن نقطة $\overline{هـ}$
 والمركز نقطة $\overline{ط}$ ونخرج من نقطة $\overline{هـ}$ الى محيط الدائرة خطوطاً كم
 شئنا وكيف وقعت ولتكن خطوط $\overline{هـ ا}$ $\overline{هـ ح}$ $\overline{هـ ز}$ فاقول ان اطول هذه
 الخطوط كلها الخط الذى عليه المركز وهو خط $\overline{هـ ج}$ واقصرها خط
 $\overline{هـ د}$ والباقية فما قَرَبَ منها من نقطة $\overline{ط}$ فهو اعظم ممّا بَعَدَ عنها .
 اقول ان خط $\overline{هـ ز}$ اعظم من خط $\overline{هـ ح}$ وخط $\overline{هـ ح}$ اعظم من خط $\overline{هـ ا}$
 برهانه انا نخرج من نقطة $\overline{ط}$ خطوط $\overline{ط ز}$ $\overline{ط ح}$ $\overline{ط ا}$ فين اجل ان
 نقطة $\overline{ط}$ مركز فان خط $\overline{ط ز}$ مساو لخط $\overline{ط ح}$ وناخذ خط $\overline{هـ ط}$ مشتركاً
 فخطا $\overline{هـ ط}$ $\overline{ط ز}$ مساويان لخطى $\overline{هـ ط}$ $\overline{ط ح}$ وزاوية $\overline{هـ ط ز}$ اعظم من
 زاوية $\overline{هـ ط ح}$ فبحسب برهان كد من ا فان خط $\overline{هـ ز}$ اعظم من خط
 $\overline{هـ ح}$ لكن خط $\overline{ط ز}$ مساو لخط $\overline{ط ج}$ فخط $\overline{هـ ط}$ مع خط $\overline{ط ز}$ مساو لخط
 $\overline{هـ ج}$ وخط $\overline{هـ ط}$ مع خط $\overline{ط ز}$ اعظم من خط $\overline{هـ ز}$ وذلك ببرهان ك من ا 36 r.
 فخط $\overline{هـ ج}$ اذن اعظم من خط $\overline{هـ ز}$ وقد تبين ان خط $\overline{هـ ز}$ اعظم من
 خط $\overline{هـ ح}$ وبمثل هذا البرهان والاستشهاد يتبين ان خط $\overline{هـ ح}$ اعظم
 من خط $\overline{هـ ا}$ وايضاً فان خطى $\overline{ا هـ}$ $\overline{هـ ط}$ اعظم من خط $\overline{ا ط}$ لكن خط
 $\overline{ا ط}$ مساو لخط $\overline{د ط}$ فاذا خطا $\overline{ا هـ}$ $\overline{هـ ط}$ اعظم من خط $\overline{د ط}$ فاذا اسقطنا
 خط $\overline{هـ ط}$ [الم] مشترك بقى خط $\overline{ا هـ}$ اعظم من خط $\overline{د هـ}$ فقد تبين ان اطول
 هذه الخطوط كلها خط $\overline{هـ ج}$ الذى على [عليه scr.] المركز [واصغرها
 تمام القطر الذى هو خط $\overline{هـ د}$ والباقي فما قَرَبَ من المركز اعظم
 ممّا بَعَدَ عنه اعنى [ان] قد تبين ان خط $\overline{هـ ز}$ اعظم من خط $\overline{هـ ح}$
 وخط $\overline{هـ ح}$ اعظم من خط $\overline{هـ ا}$. اقول انه يخرج من [نقطة] $\overline{هـ}$ عن
 جنبتي القطر الذى هو خط $\overline{د ج}$ الى محيط الدائرة خطان متساويان

Exemplificatio. Circuli $ABGD$ diametrus est GD , in qua datum est punctum E , quod centrum non est; centrum autem sit Θ . A puncto E ad ambitum circuli lineas quotlibet et utcumque ducimus, quae sint lineae EA , EH , EZ . Dico, maximam harum omnium linearum esse lineam, in qua sit centrum, scilicet lineam EG , brevis-
simam uero lineam ED , ceterarum autem quae puncto Θ propior sit, remotiore maiorem. Dico, lineam EZ lineam EH maiorem et lineam EH lineam EA maiorem esse.



Demonstratio. A puncto Θ lineas ΘZ , ΘH , ΘA ducimus. Quoniam punctum Θ centrum est, erit $\Theta Z = \Theta H$. Linea igitur $E\Theta$ communi sumpta duae lineae $E\Theta$, ΘZ duabus lineis $E\Theta$, ΘH aequales erunt. Et angulus $E\Theta Z$ angulo $E\Theta H$ maior est; itaque ex I, 24 linea EZ linea EH maior erit. Iam uero $\Theta Z = \Theta G$; itaque linea $E\Theta$ cum linea ΘZ lineae EG aequalis est. Et linea $E\Theta$ cum linea ΘZ ex I, 20 linea EZ maior est; itaque linea EG maior est linea EZ . Iam autem demonstratum est, lineam EZ lineam EH maiorem esse. Ex eadem demonstratione et eadem ratione demonstrabitur, lineam EH lineam EA maiorem esse. Rursus duae lineae AE , $E\Theta$ linea $A\Theta$ maiores sunt. Sed $A\Theta = D\Theta$; itaque duae lineae AE , $E\Theta$ linea $D\Theta$ maiores erunt. Linea igitur $E\Theta$ communi subtracta relinquitur linea AE linea ED maior. Itaque iam demonstratum est, maximam harum linearum esse EG , in qua centrum est, brevis-
simam uero ED esse, quae diametrum complet, et ceterarum, quae centro propiores sunt, maiores iis, quae ab eo remotae sunt; nam demonstraui-
mus, lineam EZ lineam EH et lineam EH lineam AE maiorem esse.

Iam dico, a puncto E ad utramque partem diametri, scilicet

برهانه انا نُخرج من نقطة [هـ] الى [قوس دكـ] خطوطاً مستقيمة مساويةً
لخطوط [اـ] هـ [حـ] فنعمل على نقطة طـ من خط طـ جـ زاويةً مثل زاوية
اطـ كما بينا عمله ببرهان كـ من اـ ولتكن زاوية بـ طـ ونعمل عليها
ايضا زاويةً مثل زاوية حـ طـ ونُنزل انها زاوية كـ طـ وايضا زاوية مثل
زاوية زـ طـ ولتكن زاوية لـ طـ ونُخرج خطوط هـ بـ هـ كـ لـ فين اجل
ان نقطة طـ مركز الدائرة فان خطوط طـ اـ طـ كـ طـ لـ تكون متساويةً
ولانا عملنا زاوية بـ طـ مساويةً اطـ فانا اذا اخذنا خط طـ مشتركاً
يكون خطا هـ طـ بـ مساويين لخطى اـ طـ طـ وزاوية اطـ مساوية
لزاوية هـ طـ بـ فبحسب برهان دـ من اـ يكون خط اـ مساوياً لخط هـ بـ
وتبين ايضاً ان خط هـ كـ مساو لخط هـ لـ لانا عملنا زاوية هـ طـ كـ
مساويةً لزاوية حـ طـ فضلعا حـ طـ مساويان لضلعي كـ طـ وزاوية
حـ طـ مثل زاوية كـ طـ فخط هـ حـ مساو لخط هـ كـ وبمثل هذا البرهان
والاستشهاد يتبين ان خط طـ زـ مساو لخط طـ لـ فقد تبين ان
خطين¹⁾ عن جنبتي القطر متساويان وذلك ما اردنا ان نبين
فاقول انه غير ممكن ان نُخرج من نقطة هـ الى قوس دكـ خطوط
مساويةً اـ هـ هـ زـ غير خطوط هـ بـ هـ كـ لـ فان امكن فلنُخرج مثل
خط هـ ونصل مـ طـ فخط طـ مـ مساو لخط طـ اـ لانهما اخراجا من المركز
الى المحيط فناخذ خط هـ طـ مشتركاً فخطا مـ طـ طـ مساويان لخطى
اـ طـ وقاعدة هـ مـ مساوية لقاعدة هـ اـ فبحسب برهان حـ من اـ تكون
زاوية مـ طـ مساوية لزاوية اطـ لكننا عملنا زاوية بـ طـ مساوية لزاوية
اطـ فزاوية مـ طـ اذن مساوية لزاوية بـ طـ العظمى مثل الصغرى هذا

¹⁾ Uerbum in cod. repetitum.

lineae DG , ad ambitum circuli duas lineas inter se aequales ductas esse.

Demonstratio. A puncto E ad arcum DKG lineas rectas lineis EA , EH , EZ aequales duximus et in puncto Θ lineae ΘG ex I, 23 construximus angulum $B\Theta E$ angulo $A\Theta E$ aequalem.*) Et in eodem puncto angulum angulo $H\Theta E$ aequalem construimus, quem supponimus esse angulum $K\Theta E$, et angulum angulo $Z\Theta E$ aequalem, qui sit angulus $L\Theta E$. Lineas EB , EK , EL ducimus. Quoniam punctum Θ centrum circuli est, lineae ΘA , $[\Theta B]$, ΘK , ΘL inter se aequales erunt. Et quoniam angulum $B\Theta E$ [angulo] $A\Theta E$ aequalem construximus, linea ΘE communi sumpta duae lineae $E\Theta$, ΘB duabus lineis $A\Theta$, ΘE aequales erunt, et $\angle A\Theta E = E\Theta B$; quare ex I, 4 erit $AE = EB$. Iam demonstratum est, esse etiam lineam EK lineae EH aequalem. Quoniam enim angulum $E\Theta K$ angulo $H\Theta E$ aequalem construximus, duo latera $H\Theta$, ΘE duobus lateribus $K\Theta$, ΘE aequalia erunt, et $\angle H\Theta E = K\Theta E$; itaque $EH = EK$. Ex eadem demonstratione et eadem ratione demonstrabitur, lineam ΘZ lineae ΘL aequalem esse. Ergo iam demonstratum est, duas lineas ad utramque partem diametri inter se aequales esse. Q. n. e. d.

Dico, fieri non posse, ut a puncto E ad arcum DKG alias lineas lineis EA , EH , EZ aequales ducamus praeter lineas EB , EK , EL . Nam si fieri possit, lineam ducamus ut EM et $M\Theta$ coniungamus; itaque linea ΘM lineae ΘA aequalis erit, quoniam a centro ad ambitum ductae sunt. Linea $E\Theta$ communi sumpta duae lineae $M\Theta$, ΘE duabus lineis $A\Theta$, ΘE aequales erunt, et basis EM basi EA aequalis; itaque ex I, 8 erit $\angle M\Theta E = A\Theta E$. Sed angulum $B\Theta E$ angulo $A\Theta E$ aequalem construximus; itaque angulus $M\Theta E$ angulo $B\Theta E$ aequalis erit, maior minori. Quod absurdum est neque fieri potest.

Ex eadem demonstratione demonstratur, fieri non posse, ut [a puncto E] ad arcum GKD alias lineas praeter lineas EB , EK , EL lineis EA , EH , EZ aequales ducamus. Q. n. e. d.

*) Haec demonstrationis ratione non intellecta addidit Arabs.

خلف غير ممكن وبمثل هذا البرهان. يتبين انه لا يمكن [ان
 نخرج من نقطة ه] الى قوس جـكـد خطوط غير هـب¹⁾ كـل يساوي
 خطوط هـا حـز وذلك ما اردنا ان نبين. قال ايـرن هذا الشكل
 قد بين فيه الرياضى ان الخطوط القريبة من المركز اعظم من
 البعيدة عنه بان صير الخطين في جهة واحدة من المركز فان فرص
 لنا خطان من جنبتي المركز احدهما اقرب اليه من الاخر فانا
 نبين ان اقربهما اليه اعظم من ابعدهما عنه بهذا العمل.:


نفرض دائرة اـبـجـ وقطرها بـجـ ومركزها د ونفرض على بـج نقطة 36 u.
 هـ ونخرج منها الى المحيط هـا هـز ونجعل هـا اقرب الى المركز من هـز
 فاقول ان هـا اعظم من هـز برهانه انا نخرج من د عمودى دح دط
 وخطى دا دز فلان اـهـ اقرب الى المركز من زـهـ فبحسب مصادرة هذه
 المقالة يكون عمود²⁾ دط اعظم من عمود دح فمربع خط دط اعظم
 من مربع خط دح فمن اجل ان كل وا[حدة] من زاويتي دطـه دحـه
 قائمة فبرهان مو من ا فان مربع دط مع مربع طـه مساو لمربع دـه
 وكذلك مربع دح مع مربع حـه مساو لمربع دـه فمربع دط مع مربع
 طـه اذن مساو لمربع دح مع مربع حـه ولكن مربع دط قد تبين انه
 اعظم من مربع دح فيبقى اذن مربع هـح اعظم من مربع هـط فخط
 هـح اذن اعظم من خط هـط. وايضا فلان زاويتي احـد زطـد كل
 واحدة منهما قائمة فبرهان مو من ا يكون مربع زط مع مربع طـد
 مساويا لمربع دز ومربع اح مع مربع حـد مساويا لمربع اد لكن خط

¹⁾ Verba quae sunt falso repetita librarius ipse erasit.

²⁾ Falso repetitum.

Hero dixit: In hac propositione geometra demonstravit, lineas centro propiores maiores esse lineis ab eo remotioribus, eo modo, ut duas lineas ad alteram partem centri ductas fingat. Sin autem duae lineae nobis propositae sunt ad utramque partem centri ductae, ita ut altera ei propior sit, propiorem remotiore maiorem esse, hoc modo demonstrabimus.

Supponimus circulum ABG , cuius diametrus sit BG et centrum D , et dato in BG puncto E ad ambitum [lineas] EA et EZ ducimus; EA autem centro propiorem supponimus quam EZ . Dico, esse $EA > EZ$.



Demonstratio. Ab D duas perpendiculares DH , $DΘ$ et duas lineas DA , DZ ducimus. Quoniam AE centro propior est quam ZE , ex praemissis huius libri*) perpendicularis $DΘ$ perpendiculari DH maior erit, et quadratum lineae $DΘ$ quadrato lineae DH maius erit. Et quoniam uterque angulus $DΘE$, DHE rectus est, ex I, 46 quadratum $DΘ$ cum quadrato $ΘE$ quadrato DE aequale erit, et eodem modo quadratum DH cum quadrato HE aequale erit quadrato DE ; quare quadratum $DΘ$ cum quadrato $ΘE$ aequale erit quadrato DH cum quadrato HE . Sed iam demonstratum est, quadratum $DΘ$ quadrato DH maius esse; relinquitur igitur quadratum EH quadrato $EΘ$ maius. Itaque linea EH maior est linea $EΘ$. Rursus quoniam uterque angulus AHD , $ZΘD$ rectus est, ex I, 46 quadratum $ZΘ$ cum quadrato $ΘD$ quadrato DZ aequale et quadratum AH cum quadrato HD quadrato AD aequale est. Uerum linea AD lineae DZ aequalis, quoniam utraque a centro ad ambitum ducta est; quadratum AH igitur cum quadrato HD aequale est quadrato $ZΘ$ cum quadrato $ΘD$. Sed iam

*) Def. 5.

اد مساو لخط دز لانهما خرّجا من المركز الى المحيط فمربع آح
 اذن مع مربع ح د مساو لمربع ز ط مع مربع ط د وقد تبين
 ان مربع د ط اعظم من مربع د ح فاذا اسقطناهما بقي مربع آح
 اعظم من مربع ز ط فخط آح اذا اعظم من خط ز ط وقد بينا ان
 خط ه ح اعظم من خط ه ط فخط ه ا اذن اعظم من خط ه ز وذلك
 ما اردنا ان نبين . وقال ايّرن ايضا فان كان الخط الذي يخرج
 من علامة د عمودا على خط ه ز لا يقع على خط ه ز لكن على الخط
 المتصل به على استقامة كعمود د ح فمن اجل ان خط دز مساو
 لخط دا لانهما خرّجا من المركز الى المحيط ومربعي د ط طا
 مساويان لمربع^{١)} اد ومربعي د ح ح ز مساويان لمربع دز فان مربعي
 د ح ح ز مساويان لمربعي د ط طا لكن مربع د ح^{٢)} اعظم من مربع
 د ط فاذا اسقطناهما بقي مربع اط اعظم من مربع ح ز فخط اط
 اذن اعظم من خط ز ح فاذا اسقطنا من خط ح ز خط ح ه وردنا
 على خط اط خط ط ه فمن البين ان جميع خط ه ا اعظم من خط
 ه ز بكثير وذلك ما اردنا ان نبين

الشكل الثامن من المقالة الثالثة


اذا فرضت نقطة خارج دائرة واخرج منها الى الدائرة خطوط
 مستقيمة احدها يجوز على المركز والاخر كيف ما وقعت من محيط
 الدائرة فان اعظمها هو الذي يجوز على المركز واصغرهما الذي يصل

^{١)} In textu: مربعي

^{٢)} In margine recte scriptum. In textu: ح ز sed erasum.

demonstratum est, quadratum $D\Theta$ quadrato DH maius esse. Quibus subtractis relinquitur quadratum AH quadrato $Z\Theta$ maius. Itaque linea AH maior linea $Z\Theta$. Iam autem demonstrauius, lineam EH linea $E\Theta$ maiorem esse. Ergo linea EA maior est linea EZ . Q. n. e. d.

Rursus Hero dixit: Linea a puncto D perpendicularis ad lineam EZ ducta in lineam EZ ne cadat, sed in lineam, quae ab ea in directum protracta est, ut perpendicularis DH . Quoniam $DZ = DA$, quia utraque a centro ad ambitum ducta est, et duo quadrata $D\Theta$, ΘA quadrato AD , quadrata autem DH , HZ quadrato DZ aequalia sunt, duo quadrata DH , HZ duobus quadratis $D\Theta$, ΘA aequalia erunt. Sed quadratum DH quadrato $D\Theta$ maius est. Quibus subtractis relinquitur quadratum $A\Theta$ quadrato HZ maius. Itaque $A\Theta > HZ$. Ergo linea HE a linea HZ subtracta et linea ΘE ad lineam $A\Theta$ addita manifestum est, totam lineam EA linea EZ multo maiorem esse. Q. n. e. d.




Propositio VIII libri tertii.

Si extra circulum punctum datum est, et ab hoc puncto ad circulum rectae lineae ducuntur, quarum una per centrum transit, ceterae autem utcumque in ambitum circuli cadunt, maxima earum est, quae per centrum ducta est, breuissima autem, quae punctum cum diametro coniungit, ceterarum autem linearum ex iis, quae circulum secant et ad concavam partem perueniunt, quae propior diametro circuli est, remotiore maior; ex iis autem, quae circulum non secant, sed ad conuexam partem perueniunt, quae propior diametro est, minor remotiore est; et duae lineae ad utramque partem diametri ad circulum a puncto illo ductae et earum, quae ad partem concavam, et earum, quae ad conuexam partem eius perueniunt, inter se aequales sunt.

Exemplificatio. Extra circulum AB datum sumimus punctum G . Lineas GD , GE , GZ , GA ducimus ita, ut circulum secent et ad concavam partem eius, h. e. ad arcum DA , perveniant, lineas autem $G\Theta$, GK , GL ita, ut ad convexam partem, h. e. ad arcum HL , perveniant.

Et linea GD per punctum M , quod centrum est, ducta sit. Dico, maximam earum, quae circulum secant, esse lineam GD , ceterarum autem, quae lineae GD propior sit, maiorem remotiore, linearum autem, quae ad convexam partem circuli perveniant, quae a linea GD remotior sit, propiore maiorem, breuissimamque omnium harum linearum lineam GH esse, praeterea si a puncto G ad utramque partem lineae GD , quae



diametrus est, ducantur lineae circulum secantes et ad concavam partem eius pervenientes, duas earum ad utramque partem diametri sitas inter se aequales esse.

Demonstratio. Si lineas MA , MZ , ME duxerimus, lineae MA , MZ , ME , MD inter se aequales erunt, quoniam a centro ad ambitum ductae sunt. Quoniam autem ex I, 20 in omnibus triangulis linea, quae duobus lateribus eius coniunctis efficitur, tertio latere maior est, erunt $GM + ME > GE$. Sed $MD - ME$; linea GD igitur linea GE maior erit. Et quoniam duo latera GM , ME trianguli GME duobus lateribus GM , MZ trianguli GMZ aequalia sunt, et angulus GME angulo GMZ maior, ex I, 24 basis GE basi GZ maior erit.

Eodem modo demonstrabimus, lineam GZ lineam GA maiorem

فبحسب برهان كد من ا تكون قاعدة جـ اعظم من قاعدة جز
وكذلك يتبين ان خط جـ اعظم من خط جـا فقد تبين ان اعظم
الخطوط جـ وان جـ الاقرب الى جـ اعظم من جـ الابدع وان جـ
اعظم من جـا فاقول ايضا ان خط جـط الذى هو ابعـد من خط جـ
اعظم من خط جـك الاقرب وجـك اعظم من جـل واقصرها كلها
خط جـ برهانه انا نخرج خطوط مـط مـك مـل فمن اجل ان كل
مثلث فان ضلعين من اضلاعه كخط واحد اعظم من الضلع
الثالث فان مـل لـج اعظم من مـج لكن مـل مثل مـح فاذا اسقطناهما
بقي لـج اعظم من حـج ومن اجل ان مثلث مـكج قد خرج من
طرفي ضلع من اضلاعه وهو ضلع مـج خطان فالتقى طرفاهما
على نقطة لـ داـجل المثلث فان بحسب برهان كا من ا يكون خط
مـل مع خط لـج اصغر من خط مـك مع خط كـج لكن خط مـك
مثل خط مـل فاذا اسقطناهما بقي خط جـك اعظم من خط جـل
وكذلك يتبين ان خط جـط اعظم من خط جـك فقد تبين ان
اعظم هذه الخطوط جـط واقصرها دـح [جـ س.] وان جـط اعظم من جـك
وجـك اعظم من جـل وجـل اعظم من جـح واقول ايضا انه قد تخرج
من نقطة جـ خطوط عن جنيتى خط جـد تقطع الدائرة وتلقى
اخصها كل خطين خطين نظيرين منها متساويان برهانه انا
نعمل على نقطة مـ من خط جـم زاوية مثل زاوية جـمـه كما بين
عملها ببرهان كـ من ا ولتكن زاوية جـمـب فلان خط مـب مساو
لخط مـه ونخرج خط جـم مشتركاً يكون خطا جـم مـب مساويين
لخطى جـم مـه وزاوية جـمـب عملت مساوية لزاوية جـمـه فبحسب برهان

esse. Itaque iam demonstratum est, lineam GD maximam harum linearum esse, et GE , quae lineae GD propior sit, remotiore GZ maiorem, et GZ [linea] GA maiorem esse.

Rursus dico, lineam $G\Theta$, quae a linea GD remotissima sit, linea GK propiore maiorem esse, et GK [linea] GL maiorem, et breuissimam omnium harum linearum esse lineam GH .

Demonstratio. Lineas $M\Theta$, MK , ML ducimus. Quoniam in quolibet triangulo duo latera eius coniuncta tertia linea maiora sunt, erunt $ML + LG > MG$. Sed $ML = MH$; his igitur duabus subtractis relinquitur $LG > HG$. Et quoniam in triangulo MKG a duobus terminis lateris eius MG duae lineae ita ductae sunt, ut termini earum in puncto L intra triangulum concurrant, ex I, 21 erunt $ML + LG < MK + KG$. Sed $MK = ML$; his igitur duabus subtractis relinquitur linea $GK > GL$.

Eodem modo demonstrabimus, lineam $G\Theta$ lineam GK maiorem esse. Itaque iam demonstratum est, $G\Theta$ maximam, GH breuissimam esse harum linearum, et $G\Theta$ maiorem esse quam GK , GK quam GL , GL quam GH .

Rursus dico: Si a puncto G ad utramque partem lineae GD ducuntur lineae circum secantes et ad concavam partem eius peruenientes, duae semper lineae eodem modo positae inter se aequales sunt.

Demonstratio. Ad punctum M lineae GM ex I, 23 angulum GMB angulo GME aequalem construimus. Iam quoniam linea MB lineae ME aequalis est et linea GM communis, duae lineae GM , MB duabus lineis GM , ME aequales erunt. Et angulus GMB angulo GME aequalis constructus est; ergo ex I, 4 basis GE basi GB aequalis erit.

Eodem modo, si duas alias lineas duximus, linea, quae lineam GB sequitur, lineae GZ aequalis erit, quarta uero lineae GA aequalis, siquidem in puncto M lineae GM duos angulos duobus angulis GMZ , GMA aequales construxerimus et deinde punctum G coniunxerimus cum termino in ambitu circuli posito lineae angulum constructum comprehendentis.

د من ا تكون قاعدة جـ مساوية لقاعدة جـ وكذلك لو اردنا ان
نُخرج خطين اخرين يكون الذى يتلو خط جـ مساويا لخط جـ
والرابع مساويا لخط جـ لعلنا على نقطة م من خط جـ زاويتين
مثل زاويتي جـم جـ ثم نُصل بين نقطة جـ وبين طرف الخط
الذى عملت الزاوية عليه من محيط الدائرة فاقول انه غير ممكن ^{37 u.}
ان يخرج من نقطة جـ الى قوس دـبـح خط اخر مساو لخط جـ غير
خط جـ ولا خط اخر مساو للخطوط الأخر سـرى الخطوط التى
خرجت فان امكن فليكن جـس ونُخرج خط مـس فمن اجل ان
خط مـبـ مساو لخط مـس لانهما خرجا من المركز فانا اذا اخذنا
خط جـم مشتركا يكون خط جـم مع خط جـ مثل جـم مع جـس
وزاوية جـمب اعظم من زاوية جـمس فبحسب برهان كد من ا
يكون جـب اعظم من جـس وكنا فرضناهما متساويين هذا خلف
فليس يمكن اذن ان يخرج من نقطة جـ الى قوس دـبـح خط
مستقيم مساو لخط جـ ولا لسائر الخطوط المساوية لخطوط جـ جـ
جـا واقول ايضا وقد تخرج من نقطة جـ خطوط عن جنبتي خط
جـ تلقى حدبة الدائرة ويكون كل خطين خطين نظيرين عن
جنبتي خط دـح متساويين برهانه انا نعمل على نقطة م من خط
جـم زاوية مثل زاوية جـم ل وتكن زاوية جـم ونصل جـع فنحط مع
مساو لخط م لانهما خرجا من المركز وناخذ جـم مشتركا نخطا
عـم مـج مثل خطى لـم مـج وزاوية عـمـج عملت مساوية لزاوية لـمـج
فقاعدة جـل مثل قاعدة جـع وبمثل هذا العمل نُخرج من نقطة جـ
الى تقبيب سـح خطوطا مساوية لخطوط جـك جـط واقول انه غير

Dico, fieri non posse, ut a puncto G ad arcum DBH alia linea ducatur lineae GE aequalis ac linea GB , et nullam aliam lineam ceteris lineis aequalem esse ac lineas ductas.

Si fieri potest, sit $GΞ$. Lineam $MΞ$ ducimus. Iam quoniam linea MB lineae $MΞ$ aequalis est, quia utraque a centro ducta est, linea GM communi sumpta erunt $GM + GB = GM + GΞ$. Et $\angle GMB > GΜΞ$; itaque ex I, 24 $GB > GΞ$. Supposuimus autem, eas inter se aequales esse; quod absurdum est. Ergo fieri non potest, ut a puncto G ad arcum DBH recta linea lineae GB ceterisque lineis, quae lineis GE , GZ , GA aequales sunt, aequalis ducatur.

Rursus dico: A puncto G ad utramque partem lineae GH lineis ductis, quae ad conuexam partem circuli perueniunt, semper duae lineae aequaliter distantes ad utramque partem lineae DH inter se aequales sunt.

Demonstratio. Ad punctum M lineae GM angulum GMO angulo GML aequalem construimus et GO ducimus. Iam linea MO lineae ML aequalis est, quoniam utraque a centro ducta est. Linea igitur GM communi sumpta duae lineae OM , MG duabus lineis LM , MG aequales erunt. Et angulus OMG angulo LMG aequalis constructus est; itaque basis GL basi GO aequalis est.

Eodem modo a puncto G ad ambitum conuexum $ΞH$ lineas lineis GK , $GΘ$ aequales ducimus. Dico, fieri non posse, ut a puncto G ad ambitum conuexum $ΞH$ alia linea lineae GO aequalis ducatur. Si enim fieri potest, linea GF ei aequalis sit. Duo puncta M , F coniungimus. Quoniam igitur in triangulo GMF a terminis lateris eius duae lineae GO , MO ductae sunt, quarum termini intra triangulum in puncto O concurrunt, ex I, 21 manifestum est, esse $GF + FM > GO + OM$. Sed $MF = MO$, quoniam utraque a centro ad ambitum ducta est. Quibus subtractis relinquitur $GF > GO$. Supposuimus autem, eas inter se aequales esse; quod absurdum est neque fieri potest. Ergo iam demonstratum est, fieri non posse, ut a puncto G ad ambitum

ممكن ان يخرج من نقطة ج الى تقبيب سح خط اخر مساو لخط جع فان امكن فليكن مثل خط جف ونصل بين نقطتي م ف فمن اجل ان مثلث جف قد خرج من طرفي ضلع من اضلاعه خطا جع مع والتقى طرفاهما داخل المثلث على نقطة ع فمن البين بحسب برهان كا من ا ان [خط] جف مع خط فم اعظم من خط جع مع خط عم لكن خط م ف مساو لخط مع لانها خرجا من المركز الى المحيط فاذا اسقطناهما بقي خط جف اعظم من خط جع وكنا فرضناهما متساويين وهذا خلف غير ممكن فقد تبين انه غير ممكن ان يخرج من نقطة ج خط يلقي تقبيب ح س مساو لخط دع ولا لسائر الخطوط التي هي نظاير لخطوط جل جك دط (جط. s) وذلك ما اردنا ان نبين .


قال ايرون من اجل ان الرياضى برهن على هذا الشكل بان صير الخطوط في الجهة الواحدة فينبغي ان نبرهن ببرهان اخر كما فعلنا في الشكل المتقدم فنقول انه اذا فرض خطان مستقيمان عن جنبتي القطر احدهما اقرب الى المركز والاخر ابعد عنه فان اقربهما اليه يكون اعظم من ابعدهما مثال ذلك انا نفرض دائرة ا ب ج ونخرج قطرها وهو خط ب ج على استقامة الى نقطة د ونخرج من د الى دائرة ا ب ج خطين اخرين مستقيمين عن جنبتي القطر وهما خطا دا ده وخط دا اقرب الى المركز من خط ده فاقول ان خط اد اعظم من خط ده برهانه انا نستخرج مركز الدائرة كما بينا اخراجه ببرهان ا من ا وليكن نقطة ز ونخرج من نقطة ز الى خطي 38 r. اد ده عمودي زح زط كما تبين اخراجه ببرهان يب من ا فمن اجل

convexum $H\Xi$ linea lineae GO ceterisque lineis, quae lineis GL , GK , $G\Theta$ aequales sunt, aequalis ducatur. Q. n. e. d.

Hero dixit: Quoniam geometra¹⁾ hanc propositionem eo modo demonstravit, ut lineas ad unam partem positas sumeret, nobis alia demonstratione, sicut in propositione praecedenti, demonstranda est.

Dicimus, si duae lineae rectae ad utramque partem diametri datae sint, altera centro propior, altera ab eo remotior, propiorem remotiore maiorem esse.

Exemplificatio. Circulo ABG dato et diametro eius linea BG ad punctum D producta a puncto D ad circum ABG duas alias lineas rectas ad utramque partem diametri positas, lineas DA , DE , ita ducimus, ut linea DA centro propior sit quam linea DE . Dico, lineam AD lineam DE maiorem esse.



Demonstratio. Centrum circuli quaerimus, sicut in I, 1 quarendum esse demonstrauius, quod sit punctum Z , et a puncto Z ad duas lineas AD , DE ex I, 12 duas perpendiculares ZH , $Z\Theta$ ducimus. Quoniam igitur linea AD puncto Z propior est quam linea DE , perpendicularis ZH minor est perpendiculari $Z\Theta$. Rursus quoniam quadratum lineae DH cum quadrato lineae ZH ex I, 46 quadrato lineae DZ aequale est, et eodem modo quadratum lineae $D\Theta$ cum quadrato lineae $Z\Theta$ quadrato lineae DZ aequale, summa duorum quadratorum DH , HZ summae duorum quadratorum $D\Theta$, ΘZ aequalis est. Sed quadratum lineae HZ quadrato lineae ΘZ minus est; quibus

¹⁾ «Euclides» apud Gherardum Cremonensem (p. 116), qui a nostris non parum discrepat.


ان خط $\overline{اد}$ اقرب الى نقطة $\overline{ز}$ من خط $\overline{ده}$ فان عمود $\overline{زح}$ اصغر من
 (مجموع) عمود $\overline{زط}$ وايضا فمن اجل ان مربع خط $\overline{دح}$ مع مربع
 خط $\overline{زح}$ مساو لمربع خط $\overline{دز}$ وذلك بحسب برهان $\overline{مرو}$ من ا وكذلك
 مربع خط $\overline{دط}$ مع مربع خط $\overline{طر}$ مساو لمربع خط $\overline{دز}$ فمجموع مربعي
 $\overline{دح}$ $\overline{حز}$ مساو [ل] مجموع مربعي $\overline{دط}$ $\overline{طر}$ لكن مربع خط $\overline{حز}$ اصغر
 من مربع خط $\overline{طر}$ فاذا اسقطناهما بقي مربع خط $\overline{دح}$ اعظم من
 مربع خط $\overline{دط}$ فخط $\overline{دح}$ اعظم من خط $\overline{دط}$ وايضا فان خط $\overline{از}$ مثل
 خط $\overline{زه}$ [لأنهم] ا خرجا من المركز الى المحيط لكن مجموع مربعي
 خطي $\overline{زح}$ $\overline{اح}$ مساو لمربع خط $\overline{از}$ ومجموع مربعي خطي $\overline{زط}$ $\overline{طه}$ مساو
 [لمربع] خط $\overline{زه}$ فمجموع مربعي خطي $\overline{زط}$ $\overline{طه}$ اذا مساو لمجموع مربعي
 خطي $\overline{زح}$ $\overline{حط}$ لكن مربع خط $\overline{زح}$ اصغر من مربع خط $\overline{زط}$ فاذا
 اسقطناهما بقي مربع خط $\overline{اح}$ اعظم من مربع خط $\overline{طه}$ وكنا بينا
 ان خط $\overline{دح}$ اعظم ايضا من خط $\overline{دط}$ فخط $\overline{دا}$ اذا اعظم من خط
 $\overline{ده}$ وذلك ما اردنا ان نبين . . . ونبين ايضا ان الخطوط التي تلقى
 تقبيب الدائرة ما كان منها اقرب الى الخط الذي بين العلامة
 وبين القطر يكون اصغر من ما كان منها ابعد عنه ونفعل ذلك
 ايضا في خطين مستقيمين يكونان عن جنبتي الخط الذي بين
 العلامة والقطر فننزل ان الدائرة دائرة $\overline{ابج}$ وقطرها خط $\overline{بج}$
 ونخرج خط $\overline{بج}$ على استقامة الى نقطة $\overline{د}$ ونخرج من نقطة $\overline{د}$ الى
 تقبيب الدائرة خطي $\overline{ده}$ $\overline{دز}$ ونجعل خط $\overline{ده}$ اقرب الى خط $\overline{دج}$ من
 خط $\overline{دز}$ فاقول ان خط $\overline{ده}$ اصغر من خط $\overline{دز}$ برهانه انا نخرج خطي
 $\overline{ده}$ $\overline{دز}$ الى اخصص الدائرة فليخرجا الى نقطتي $\overline{اح}$ ونطلب مركز

subtractis relinquitur quadratum lineae DH quadrato lineae $D\Theta$ maius. Itaque linea DH maior erit linea $D\Theta$. Rursus $AZ = ZE$, quoniam utraque a centro ad ambitum ducta est. Sed summa duorum quadratorum duarum linearum ZH , AH quadrato lineae AZ aequalis est, summa autem duorum quadratorum duarum linearum $Z\Theta$, ΘE quadrato lineae ZE aequalis est; itaque summa duorum quadratorum duarum linearum $Z\Theta$, ΘE summae duorum quadratorum duarum linearum ZH , HA aequalis est. Sed quadratum lineae ZH quadrato lineae $Z\Theta$ minus est; quibus subtractis relinquitur quadratum lineae AH quadrato lineae ΘE maius. Demonstrauimus autem, etiam lineam DH maiorem esse linea $D\Theta$. Ergo linea DA maior est linea DE . Q. n. e. d.

Demonstrabimus etiam, ex iis lineis, quae cum ambitu circuli conuexo concurrant. propiorem lineae inter punctum et diametrum ductae minorem esse remotiore, et hoc quoque in duabus lineis rectis facimus, quae ad utramque partem lineae inter punctum et diametrum ductae positae sunt.

Supponimus, circulum esse circulum ABG , cuius diametrus sit linea BG , et linea BG ad punctum D producta a puncto D ad ambitum conuexum circuli duas lineas DE , DZ ducimus, et lineam DE propiorem lineae DG quam lineam DZ supponimus. Dico, lineam DE linea DZ minorem esse.

Demonstratio. Duas lineas DE , DZ ad concauam partem circuli ducimus; ad duo puncta A , H ducantur. Centrum circuli quaerimus, quod sit punctum Θ , et a puncto Θ duabus perpendicularibus ΘK , ΘL ductis duo puncta Θ , E et duo puncta Θ , Z duabus lineis ΘE , ΘZ coniungimus.



الدائرة وهو نقطة ط ونخرج من نقطة ط عمودى ط ك ط ل ونصل بين نقطتى ط ه ونقطتى ط ز بخطى ط ه ط ز فمن اجل ان زاوية ده ط خارج مثلث ه ك ط وزاوية ه ك ط قائمة فان بحسب برهان يو من ا تكون زاوية ده ط اعظم من زاوية ه ك ط فزاوية ده ط اذن مُنفرجة وكذلك يتبين ان زاوية د ز ط مُنفرجة فمثلثا ده ط د ز ط منفرجا الزاوية وكل زاوية منفرجة فان مربع الضلع الذى يؤثر الزاوية المنفرجة مساو لمجموع المربعين الكائنين من الضلعين المحيطين بالزاوية المنفرجة مع ضعف السطح الذى يحيط به احد الضلعين المحيطين بالزاوية المنفرجة الذى يقع على استقامة العمود والخط الذى بين العمود وطرف الزاوية المنفرجة وذلك بحسب برهان يب من ب فالمربعان الكائنان من ضلعى ده ط مع ضعف السطح الذى يحيط به خطا ده ه ك مساو لمربع خط د ط وكذلك مجموع مربعى خطى د ز ط مع ضعف السطح الذى يحيط به خطا د ز زل مساو لمربع خط د ط فمجموع مربعى خطى د ز ط مع ضعف السطح الذى يحيط به خطا د ز زل مساو لمجموع مربعى خطى د ز ط مع ضعف السطح الذى يحيط به خطا د ز زل مساو لمجموع مربعى خطى ده ه ط مع ضعف السطح الذى يحيط به خطا ده ه ك فمن اجل ان ه ك مساو لخط ك ا وخط زل مساو لخط ل ح وذلك بحسب برهان ج من ج فانه بحسب برهان ا من ب يكون ضعف السطح الذى يحيط به خطا ده ه ك مساويا للسطح الذى يحيط به خطا ده ه ا وكذلك ضعف السطح الذى يحيط به خطا د ز زل مساو للسطح الذى يحيط به خطا د ز ز ح فالسطح الذى يحيط به خطا ده ه د مع المربع الكائن من خط ده مساو للسطح الذى يحيط به خطا ح ز د مع

Iam quoniam angulus $DE\Theta$ ad triangulum $EK\Theta$ extrinsecus positus est et angulus $EK\Theta$ rectus, ex I, 16 angulus $DE\Theta$ angulo $EK\Theta$ maior erit; quare angulus $DE\Theta$ obtusus erit. Eodem modo demonstrabimus, angulum $DZ\Theta$ obtusum esse. Itaque duo trianguli $DE\Theta$, $DZ\Theta$ obtusianguli sunt. In quouis autem angulo obtuso constat, quadratum lateris angulo obtuso oppositi aequale esse summae duorum quadratorum duorum laterum, quae angulum obtusum comprehendunt, cum duplo spatii, quod comprehenditur uno ex duobus lateribus, quae angulum obtusum comprehendunt, eo scilicet, in quod productum perpendicularis cadit, et linea inter perpendicularem et uerticem anguli obtusi posita, quod ex II, 12 adparet; itaque duo quadrata duorum laterum DE , $E\Theta$ cum duplo spatii duabus lineis DE , EK comprehensi quadrato lineae $D\Theta$ aequalia erunt. Eodem modo summa duorum quadratorum duarum linearum DZ , $Z\Theta$ cum duplo spatii duabus lineis DZ , ZL comprehensi quadrato lineae $D\Theta$ aequalis erit. Itaque summa duorum quadratorum duarum linearum DZ , $Z\Theta$ cum duplo spatii duabus lineis DZ , ZL comprehensi aequalis erit summae duorum quadratorum duarum linearum DE , $E\Theta$ cum duplo spatii duabus lineis DE , EK comprehensi. Quoniam autem ex III, 3 $EK = KA$ et $ZL = LH$, ex II, 1 duplum spatii duabus lineis DE , EK comprehensi aequale erit spatium, quod duabus lineis DE , EA comprehenditur. Eodem modo duplum spatii duabus lineis DZ , ZL comprehensi spatium duabus lineis DZ , ZH comprehensi aequale erit. Itaque spatium duabus lineis AE , ED comprehensum cum quadrato lineae DE spatium duabus lineis HZ , ZD comprehenso cum quadrato lineae DZ aequale erit. Sed ex II, 3 spatium, quod duae lineae AE , ED comprehendunt, cum quadrato lineae DE spatium, quod duae lineae AD , DE comprehendunt, aequale erit; et eodem modo spatium, quod duae lineae HZ , ZD comprehendunt, cum quadrato lineae DZ spatium duabus lineis HD , DZ comprehenso aequale erit; spatium igitur, quod duae lineae AD , DE comprehendunt, spatium, quod duae lineae HD , DZ comprehendunt, aequale erit. Iam autem

المربع الكائن من خط $\overline{دز}$ لكن بحسب برهان ج من ب فان
السطح الذى يحيط به خط $\overline{اه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ده}$
مساو للسطح الذى يحيط به خط $\overline{اد}$ وكذلك السطح الذى
يحيط به خط $\overline{حز}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{دز}$ مساو للسطح
38 u. الذى يحيط به خط $\overline{ح د}$ فالسطح اذن الذى يحيط به خط
 $\overline{اد}$ مساو للسطح الذى يحيط به خط $\overline{ح د}$ وقد بينا ان خط
 $\overline{اد}$ اعظم من خط $\overline{ح د}$ لانه اقرب الى المركز فخط $\overline{ده}$ اذن اصغر من
خط $\overline{دز}$ وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل التاسع من المقالة الثالثة


كل نقطة في داخل دائرة يخرج منها الى الخط المحيط بالدائرة
اكثر من خطين وتكون كلهما متساوية فان تلك النقطة
مركز لتلك الدائرة . مثال ان في داخل دائرة $\overline{اب}$ نقطة ج وقد
خرج منها الى الخط المحيط بالدائرة اكثر من خطين وهى كلها
متساوية وهى خطوط $\overline{ج ب}$ $\overline{ج د}$ $\overline{ج ه}$ فاقول ان [نقطة] ج مركز لدائرة
 $\overline{اب}$ يرهانه انا نخرج خطى $\overline{ب د}$ $\overline{د ه}$ ونقسم كل واحد منهما
بنصفين على نقطتى $\overline{ز ح}$ ونخرج خطى $\overline{ج ز}$ $\overline{ج ح}$ ونفذهما في
الجهتين جميعا الى محيط الدائرة وهما خطا $\overline{ا ط}$ $\overline{ا ك}$ فمن اجل ان
خط $\overline{ب ز}$ فصلناه مساويا لخط $\overline{ز د}$ فاذا اخذنا $\overline{ز ج}$ مشتركا فان
خطى $\overline{ج ز}$ $\overline{ب ز}$ مساويان لخطى $\overline{ج ز}$ $\overline{د ز}$ وقاعدة $\overline{ج ب}$ مساوية لقاعدة
 $\overline{ج د}$ فان بحسب برهان ح من ا فان زاوية $\overline{ج ب}$ مساوية لزاوية $\overline{ج د}$
وكل واحدة منهما اذا قائمة فبحسب ما تبين في وجود مركز

demonstrauimus, lineam AD linea HD maiorem esse, quia centro propior est. Ergo linea DE linea DZ minor erit. Q. n. e. d.¹⁾

Propositio IX libri tertii.

Si a puncto intra circulum posito ad lineam circulum comprehendentem plures quam duae lineae omnes inter se aequales ducuntur, punctum illud circuli centrum est.

Exemplificatio. Intra circulum AB sit punctum G , a quo ad lineam circulum comprehendentem plures quam duae lineae omnes inter se aequales, scilicet lineae GB , GD , GE , ductae sint. Dico, punctum G centrum circuli AB esse.



Demonstratio. Duabus lineis BD , DE ductis utramque ad duo puncta Z , H in binas partes aequales diuidimus. Duas lineas GZ , GH ductas ad utramque partem ad ambitum circuli producimus, quae sint duae lineae $AΘ$, KM . Quoniam

¹⁾ In margine est: قال الشيخ لان السطح الذي يحيط به خطا DA اذا قُسم على DE خرج DA والسطح الذي يحيط به خطا DE اذا قُسم على DZ خرج DZ و DA اعظم من DZ والسطحان متساويان فيجب ان يكون المقسوم عليه الاول اصغر من المقسوم عليه الثاني.

Uir doctissimus dixit: Quoniam, si spatium duabus lineis DA , DE comprehensum per DE diuiditur, DA euadit, et, si spatium duabus lineis DE , DZ comprehensum per DZ diuiditur, DE euadit, et $DA > DE$, et duo spatia inter se aequalia sunt, necesse est, priorem diuisorem secundo minorem esse.

الدائرة أنه متى قُسم خط $\overline{ب د}$ بنصفين وأُخرج مثل خط $\overline{ا ط}$ عموداً على خط $\overline{ب د}$ ^{١)} فإنّ على خط $\overline{ا ط}$ يكون مركز الدائرة فمركز الدائرة إذاً على خط $\overline{ا ط}$ وبمثل هذا البرهان وهذا الاستشهاد يتبيّن ان مركز الدائرة على خط $\overline{ك م}$ فين الظاهر أنّ المركز على النقطة التي عليها تقاطع خط $\overline{ا ط}$ $\overline{ك م}$ فمركز الدائرة على نقطة $\overline{ج}$ فنقطة $\overline{ج}$ اذن مركز للدائرة وذلك ما اردنا ان نبين .:

الشكل العاشر من المقالة الثالثة

لا يُمكن ان تُقاطع دائرة دائرة أخرى على اكثر من موضعين فان امكن فلتقاطع دائرة $\overline{ا ب}$ دائرة $\overline{ج د}$ على اكثر من علامتين وليكن على علامات $\overline{ه ز ح}$ ونُخرج خطي $\overline{ه ز ح}$ ونقسم كل واحد منهما بنصفين على نقطتي $\overline{ك ل}$ ونُجيز على نقطتي $\overline{ك ل}$ خطي $\overline{ا ب}$ $\overline{ج د}$ يقطعان خطي $\overline{ه ز ح}$ على زوايا قائمة بحسب ما بين ببرهان يا من ا فمن اجل ان خط $\overline{ه ز ح}$ في دائرتي $\overline{ا ب}$ $\overline{ج د}$ وقد قُسم بنصفين على علامة $\overline{ل}$ وأُخرج عليه خط $\overline{ل ب}$ ^{٢)} على زاوية قائمة فبحسب ما بينا في ^{٣)} برهان $\overline{ط م}$ من $\overline{ج}$ فإنّ مركز دائرتي $\overline{ا ب}$ $\overline{ج د}$ على خط $\overline{ا ب}$.: وايضاً فان خط $\overline{ه ز ح}$ وقع في دائرتي $\overline{ا ب}$ $\overline{ج د}$ وقد قُسم بنصفين على نقطة $\overline{ك}$ وأُخرج خط $\overline{ج ك د}$ على زوايا قائمة على خط $\overline{ه ز ح}$ فمركز دائرتي $\overline{ا ب}$ $\overline{ج د}$ على خط $\overline{ج ك د}$ فمركز الدائرتين على خطي $\overline{ا ب}$ $\overline{ج د}$ فهما إذن على الفصل المشترك للخطين فهما

^{١)} Sic in margine manu recentiore correctum; in textu $\overline{ب ج}$


^{٢)} In textu: خطا ^{٣)} In margine additum.

lineam BZ lineae ZD aequalem abscidimus, ZG communi sumpta duae lineae GZ , ZB duabus lineis GZ , ZD aequales erunt; et basis GB basi GD aequalis est; itaque ex I, 8 $\angle GZB = \angle GZD$; quare uterque rectus est. Sed quoniam iam in centro inueniundo demonstratum est, si linea BD in duas partes aequales diuisa sit, et linea $A\Theta$ ad lineam BD perpendicularis ducta, centrum circuli in linea $A\Theta$ positum esse, centrum circuli in linea $A\Theta$ erit. Et eadem demonstratione et ratione demonstrabitur, centrum circuli in linea KM esse. Manifestum igitur est, centrum in eo puncto esse, in quo duae lineae $A\Theta$, KM inter se secant, ita ut centrum circuli in puncto G sit. Ergo punctum G centrum circuli est. Q. n. e. d.

Propositio X libri tertii.

Fieri non potest, ut circulus alium circulum pluribus locis secet quam duobus.

Nam, si fieri potest, circulus AB circulum GD in pluribus quam duobus punctis secet, scilicet in punctis E , Z , H . Duabus lineis EZ , ZH ductis utramque in punctis K , L in binas partes aequales diuidimus et per puncta K , L duas lineas ducimus AB , GD , quae duas lineas EZ , ZH ad rectos angulos secant, ex eo, quod in I, 11 demonstratum est.



Quoniam linea ZH in duobus circulis AB , GD posita ad punctum L in duas partes aequales secta est, et ad eam linea ALB ad angulos rectos ducta est, ex III, 9*) centrum duorum circulorum AB , GD in linea AB erit.

*) Citari debuit III, 1 coroll. p. 11.

على نقطة ن فنقطة ن مركز لدائرتي أب جد وقد تبين ببرهان ه
من ج ان كل دائرتين تتقاطعان فليس مراكزهما بواحد
فليس يمكن ان تقاطع دائرة دائرة الا في موضعين وذلك ما اردنا
ان نبين .:

قال ايرن نبين هذا بالشكل التاسع فنقول ان امكن ان ^{39 r.}
تقاطع دائرة دائرة على اكثر من علامتين فلتقاطع دائرة أب جد
دائرة ب ج ه على اكثر من علامتين اعني على علامات ب ج ه ز
ونستخرج مركز دائرة أب جد كما بين اخراجه ببرهان ا من ج
و[نفرضه] على علامة ط ونخرج خطوط ط ب ط ج ط ه فمن اجل ان
نقطة ط مركز أب جد فان خطوط ط [ب] ط ج ط ه تكون متساوية
ولان نقطة ط داخل دائرة ب ج ه وقد خرج منها الى محيطها¹⁾
خطوط متساوية اكثر [من] خطين فبحسب برهان ط من ج تكون
نقطة ط مركزاً لدائر ب ج ه وهي ايضا مركز لدائرة أب جد فدائرتان
[تقاطعان] مركزاهما نقطة واحدة هذا خلف لانا قد بينا ببرهان
ه من ج ان هذا غير ممكن وذلك ما اردنا ان نبين .:

الشكل الحادى عشر من المقالة الثالثة


كل دائرتين تماسان فالخط الذى يجوز على مركزيهما يقع
حيث تماسان مثاله ان دائرتي أب ج تماسان على نقطة ا و مركز
دائرة أب نقطة ه ومركز دائرة ج نقطة ن فاقول ان الخط المستقيم
الذى يجوز على نقطتي²⁾ ه ن يقع على نقطة ا لا يمكن غيره فان

¹⁾ In textu: المحيطها ²⁾ In textu: نقطة

Rursus quoniam linea EZ in duobus circulis AB , GD est et ad punctum K in duas partes aequales diuisa est, et linea GKD ad rectos angulos ad lineam EZ ducta est, centrum duorum circulorum AB , GD in linea GKD erit. Itaque centrum duorum circulorum in duabus lineis AB , GD positum est; quare in communi duarum linearum sectione est, h. e. in puncto N . Itaque punctum N centrum est duorum circulorum AB , GD . Sed ex III, 5 iam demonstratum est, si duo circuli inter se secent, centra eorum idem punctum non esse. Ergo fieri non potest, ut circulus circulum secet nisi duobus locis. Q. n. e. d.

Hero dixit:*) Hanc propositionem ex propositione IX demonstrabimus. Dicimus igitur: Si fieri potest, ut circulus circulum in pluribus punctis secet quam duobus, circulus $ABGD$ circulum $BGEZ$ in pluribus quam duobus punctis secet, scilicet in punctis B , G , E , Z . Ex III, 1 centrum circuli $ABGD$ quaerimus, quod in puncto Θ sit, et lineas ΘB , ΘG , ΘE ducimus.

Quoniam punctum Θ centrum est [circuli] $ABGD$, lineae ΘB , ΘG , ΘE inter se aequales erunt. Et quoniam punctum Θ intra circulum $BGEZ$ cadit, et ab eo ad ambitum eius plures quam duae lineae inter se aequales ductae sunt, ex III, 9 punctum Θ centrum circuli $BGEZ$ est. Idem



autem circuli $ABGD$ centrum est. Itaque centra duorum circulorum inter se secantium idem punctum est. Quod absurdum est, quoniam iam in III, 5 demonstrauius, hoc fieri non posse. Q. n. e. d.

Propositio XI libri tertii.


Si duo circuli inter se contingunt, linea, quae per centra eorum transit, in contactum eorum cadit.

*) Est demonstratio altera apud Euclidem I p. 830.

امكن ان يجوز على مركبهما ويقع على غير نقطة التماس فليقع كخط
 هـ ز ح ط ونخرج خطى اه از فبحسب برهان ك من ا يكون ضلعا
 از زه مجموعين اعظم من ضلع اه لكن خط از مساو لخط زح
 لانهما خرجا من المركز الى المحيط ونجعل خط هز مشتركا فخط
 هـ ح اذن اعظم من خط هـ ا وخط هـ ا مثل خط هـ ط لانهما خرجا من
 المركز الى المحيط فخط هـ ح اذن اعظم من خط هـ ط الاصغر اعظم
 من الاعظم هذا محال فقد ظهر ان الخط الذى يجوز على نقطتي
 هـ ن ليس يقع على موضع اخر غير نقطة ا وذلك ما اردنا ان نبين .
 قال ايرن ان الرياضى فرض فى هذا الشكل الدائرتين متماستين
 من داخل فنبين نحن ذلك وان كانت المماس من خارج فلنفرض
 دائرتي اب جد متماسان على نقطة ج وليكن مركز دائرة اب نقطة
 ن ومركز دائرة جد نقطة هـ فاقول ان الخط المستقيم الذى يجوز على
 نقطتي هـ ن يمر بنقطة ج برهانه انه لا يمكن غير هـ فان امكن
 فليكن الخط الذى يمر بنقطتي هـ ن لا يجوز على نقطة ج ولكن ليمر
 بموضع اخر كخط زط كح ونخرج خطى جز جح فيحدث مثلث
 جزح فبحسب برهان ك من ا يكون ضلعا زج جح مجموعين
 اعظم من ضلع زح لكن خط جح مساو لخط ح ك وخط زط مساو
 لخط زج فمجموع خطى زج جح مساو لمجموع خطى ح ك زط فاذن
 مجموع خطى ح ك زط اعظم من خط زح الاصغر اعظم من الاعظم
 هذا محال فالخط المستقيم اذن الذى¹⁾ يجوز على نقطتي هـ ن اللتين

¹⁾ In codice repetitum.

Exemplificatio. Duo circuli AB , AG in puncto A inter se contingunt, et centrum circuli AB punctum E est, circuli uero AG punctum N . Dico, lineam rectam, quae per duo puncta E , N transeat, in punctum A cadere. Neque enim aliter fieri potest.*) Sed si fieri potest, ut per centra horum duorum transeat et in aliud



punctum ac punctum contactus cadat, cadat ut linea $EZH\Theta$. Duabus lineis AE , AZ ductis ex I , 20 duo latera AZ , ZE coniuncta latere AE maiora erunt. Sed linea AZ lineae ZH aequalis est, quoniam utraque a centro ad ambitum ducta est.***) Itaque linea EZ communi sumpta linea EH maior erit linea EA . Et $EA = E\Theta$, quoniam utraque a centro ad ambitum ducta est; itaque linea EH maior erit linea $E\Theta$, minor maior maiore. Quod absurdum est. Ergo manifestum est, lineam per duo puncta E , N transeuntem in alium locum non cadere ac punctum A . Q. n. e. d.

Hero dixit.***) In hac propositione geometra supposuit duos circulos intra se contingentes. Nos hoc demonstrabimus, etiam ubi extrinsecus inter se contingunt.

Duos circulos AB , GD supponamus, qui inter se in puncto G contingant. Sitque centrum circuli AB punctum N , circuli uero GD punctum E . Dico, lineam rectam per duo puncta E , N transeuntem per punctum G transire.

Demonstratio. Neque enim aliter fieri potest. Sed si fieri potest, linea, quae per duo puncta E , N transit, ne transeat per punctum G , sed per alium locum transeat, ut fiat linea

*) Interpres male accepit Graecum $\mu\eta\gamma\acute{\alpha}\rho$ (sc. $\xi\sigma\tau\omega$).

**) Itaque Z centrum circuli sumitur, non N , qua littera addita omnia confudit Arabs. Similiter egit in propositione ab Herone infra addita, sed cum minore damno demonstrationis.

***) Ergo Hero apud Euclidem III, 12 non habuit.

هما المركزان ليس يُمكن ان يجوز على موضع من المواضع الا على نقطة ج الموضع الذى عليه تماس الدائرتان و ذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل الثانى عشر من المقالة الثالثة

لا تماس دائرة دائرة أخرى على أكثر من علامة واحدة من ^u 39 داخل كانت المماسّة او من خارج فان امكن ان تتماسّ دائرتان على أكثر من علامة واحدة فلتتماسّ اما من داخل فدائرتا ا ب ج د على نقطتي ج د واما من خارج فدائرتا ا ب ط ح على نقطتي ا ب فلنبرهن على اللتين قد تماسّتا من داخل فننزل ان مركز دائرة ا ب نقطة ه ومركز دائرة ج د نقطة ز فالخط الذى يجوز على نقطتي ه ز بحسب ما قد تبين ببرهان يا من ج يقع حيث تتماسّ الدائرتان فلتكن كخط ج ه ز فمِنْ اجل ان نقطة ه مركز لدائرة [ا ب] وقد خرج منها الى المحيط خطا ه د ه ه فهما متساويان فخط ه ز اعظم من ز د فخط جز اذن اعظم من ز د بكثير وايضا فانا فرضنا نقطة ز مركزا لدائرة ج د فخط ز ج¹⁾ مساو [لخط] ز د فخط ز ج الاعظم اذن مساو لخط ز د الاصغر هذا خلف غير ممكن فليس يمكن ان تماسّ دائرة دائرة الا على نقطة واحدة وهذا اذا كانت المماسّة من داخل ونُبَيّن ايضا انه ولا اذا كانت المماسّة من خارج يمكن ان تتماسّا الا على نقطة واحدة برهانه انه ان امكن ان تماسّ دائرة ا ب دائرة ح ط على أكثر من نقطة فلتتماسّا على نقطتي ا ب

¹⁾ In margine clarius scriptum.

فإن اجل أن على محيط دائرة $\overline{اب}$ نقطتي $\overline{اب}$ فبين الظاهر بحسب
برهان $\overline{ب}$ من $\overline{ج}$ أن الخط المستقيم الذي يصل بين نقطتي $\overline{ا}$ $\overline{ب}$
يقع داخل دائرة $\overline{اب}$ فليقع كخط $\overline{اب}$ ومن اجل أن على محيط
دائرة $\overline{ح}$ نقطتي $\overline{ا}$ $\overline{ب}$ فبحسب برهان $\overline{ب}$ من $\overline{ج}$ فإن الخط المستقيم
الذي يصل بينهما يقع داخل دائرة $\overline{ح}$ وقد وقع خارجاً منها
هذا خلف غير ممكن فليس تتماس دائرتان من خارج الا على
نقطة أو ذلك ما اردنا ان نبين .

قال إيرن نُقدِّم مقدِّمة يُحتاج اليها في الشكل الثاني عشر
خطٌ مستقيمٌ لا يقطعُ محيطَ دائرةٍ على اكثر من علامتين فإن
امكن فليقطع خط $\overline{ا}$ المستقيم دائرة $\overline{ا}$ على اكثر من علامتين
اعنى على علامات $\overline{ا}$ $\overline{ب}$ $\overline{ج}$ ونستخرج مركز الدائرة كما بيّن^{١)}
استخراجه ببرهان $\overline{ا}$ من $\overline{ج}$ وليكن نقطة $\overline{ه}$ ونصل خطوط $\overline{ه}$ $\overline{ا}$ $\overline{ب}$ $\overline{ج}$
فإن اجل ان خط $\overline{ا}$ $\overline{ب}$ $\overline{ج}$ خطٌ واحدٌ مستقيمٌ وزاوية $\overline{ه}$ $\overline{ا}$ خارج مثلث
 $\overline{ه}$ $\overline{ب}$ $\overline{ج}$ فان بحسب برهان $\overline{يو}$ من $\overline{ا}$ تكون زاوية^{٢)} $\overline{ه}$ $\overline{ا}$ اعظم من
زاوية $\overline{ه}$ $\overline{ب}$ لكن زاوية $\overline{ه}$ $\overline{ا}$ مساوية لزاوية $\overline{ه}$ $\overline{ب}$ وذلك بين بحسب
برهان $\overline{ه}$ من $\overline{ا}$ فزاوية $\overline{ه}$ $\overline{ا}$ اذن اعظم من زاوية $\overline{ه}$ $\overline{ب}$ لان ضلع $\overline{ه}$
مساو لضلع $\overline{ه}$ $\overline{ا}$ فانه بحسب [برهان] $\overline{ه}$ من $\overline{ا}$ تكون زاوية $\overline{ه}$ $\overline{ا}$ مساوية
لزاوية $\overline{ه}$ $\overline{ب}$ وقد كانت اعظم منها هذا خلف غير ممكن فاذن خطٌ
مستقيمٌ لا يقطعُ محيطَ دائرةٍ على اكثر من علامتين وذلك ما اردنا
ان نبين . فان قال قائل ان مركز الدائرة يمكن ان يكون على

^{١)} ذلك erasum.

^{٢)} Pro uerbo كل eraso in margine est زاوية

GZ multo maior est [linea] ZD .

Rursus punctum Z centrum circuli GD supponimus. Linea ZG igitur lineae ZD aequalis est, ita ut maior linea ZG lineae ZD minori aequalis fiat. Quod absurdum est



neque fieri potest. Ergo fieri non potest, ut circulus circulum nisi in uno puncto contingat.

Ita igitur res se habet, ubi intra se contingunt. Iam uero demonstrabimus, etiam si extrinsecus contingant, fieri non posse, ut inter se contingant nisi in uno puncto.

Demonstratio. Nam si fieri potest, ut circulus AB circulum $H\theta$ in pluribus punctis contingat, in duobus punctis A, B inter se contingant. Iam quoniam in ambitu circuli AB duo puncta A, B sunt, ex III, 2 manifestum est, lineam rectam duo puncta A, B coniungentem intra circulum AB cadere. Cadat igitur ut linea AB . Et quoniam duo puncta A, B in ambitu circuli $H\theta$ sunt, ex III, 2 linea recta ea coniungens intra circulum $H\theta$ cadit. At extrinsecus cadit. Quod absurdum est neque fieri potest. Ergo duo circuli extrinsecus inter se non contingunt nisi in [uno] puncto. Q. n. e. d.

Hero dixit. Propositionem praeuiam praemittimus, qua in propositione XII opus est.

Linea recta ambitum circuli in pluribus punctis quam duobus non secat. Nam si fieri potest, linea recta AG circulum DAG in pluribus punctis quam duobus secet, uelut in punctis A, B, G . Centrum circuli ex III, 1 sumimus, sitque punctum E . Lineas EA, EB, EG ducimus. Quoniam linea ABG una linea recta est, et angulus EBA extra



خط $\overline{اب}$ فعند ذلك نقول انه ان امكن فليكن على علامة $\overline{ز}$ فمن اجل ان علامة $\overline{ز}$ مركز دائرة $\overline{ابجد}$ فان خط $\overline{از}$ مساو لخط $\overline{زب}$ وايضا فان خط $\overline{زا}$ مساو لخط $\overline{زب}$ فخط $\overline{زب}$ اذن مساو لخط $\overline{زب}$ فاذن خط $\overline{جبز}$ الاعظم مساو لخط $\overline{زب}$ الاصغر وذلك غير ممكن فاذن خط مستقيم لا يقطع محيط دائرة على اكثر من علامتين وذلك ما اردنا ان نبين .


قال ايرن ايضا في الشكل الثاني عشر ان امكن ان تتماس ^{40 r.} دائرتان على اكثر من علامة واحدة فلتتماس دائرتا $\overline{ابجد}^1$ $\overline{اهجز}$ من داخل على اكثر من علامة اعني على علامتي $\overline{ا}$ $\overline{ج}$ ولنستخرج مركز دائرة $\overline{اهجز}$ ¹⁾ $\overline{اهجز}$ كما بين اخراجه ببرهان $\overline{ا}$ من $\overline{ج}$ وليكن نقطة $\overline{ح}$ ومركز دائرة $\overline{ابجد}$ وننزل انه خارج دائرة $\overline{اهجز}$ على علامة $\overline{ط}$ فنقول ان المركز لا يقع خارجا فان امكن فانا نصل بين نقطتي $\overline{ح}$ $\overline{ط}$ اللتين هما المركزان بخط $\overline{حط}$ فمن البين بحسب برهان $\overline{يا}$ من $\overline{ج}$ ان خط $\overline{حط}$ اذا اخرج في جهتيه جميعا فانه يحوز على مواضع المباشرة فهو اذن يحوز على نقطتي $\overline{ا}$ $\overline{ج}$ فلنخرجه فيصير اذن وضع هذا الخط كوضع خط $\overline{احزط}$ فخط $\overline{احزط}$ يقطع دائرة $\overline{اهجز}$ على اكثر من علامتين وقد بينا ان ذلك غير ممكن فليس يقع [مركز دائرة $\overline{ابجد}$ خارج دائرة $\overline{اهجز}$ وبمثل هذا نبين انه لا يقع على قوس $\overline{ازج}$ فان [امكن] فليكن مثل نقطة $\overline{ز}$ فخط $\overline{احزط}$ واحد مستقيم يقطع محيط دائرة $\overline{اهجز}$ على اكثر من علامتين اعني على علامات $\overline{ا}$ $\overline{ز}$ $\overline{ج}$ وذلك غير ممكن فغير

¹⁻¹⁾ Haec uerba in margine addita sunt.

triangulum EBG positus est, ex I, 16 angulus EBA maior est angulo EGB . Sed ex I, 5 erit $\angle EBA = \angle EAB$; quare $\angle EAB > \angle EGB$. Quoniam autem $EG = EA$, ex I, 5 erit $\angle EAB = \angle EGB$. At maior erat. Quod absurdum est neque fieri potest. Ergo linea recta ambitum circuli in pluribus punctis quam duobus non secat. Q. n. e. d.

Si quis dixerit: Fieri potest, ut centrum circuli in linea AB sit, concedamus, id fieri posse, sitque in puncto Z . Iam quoniam punctum Z centrum est circuli $ABGD$, erit $AZ = ZB$, et rursus $ZA = ZB$. Quare linea ZBG lineae ZB aequalis erit, linea GBZ maior lineae ZB minori aequalis. Quod fieri non potest. Ergo linea recta ambitum circuli in pluribus punctis quam duobus non secat. Q. n. e. d.

Rursus Hero dixit ad propositionem XII. Si fieri potest, ut duo circuli in pluribus punctis quam in uno inter se contingant, duo circuli $ABGD$, $AEGZ$ intra contingant inter se in pluribus punctis quam in uno, uelut in duobus punctis A , G . Ex III, 1 centrum circuli $AEGZ$ sumimus, quod sit punctum H , et centrum circuli $ABGD$, quod extra circum $AEGZ$ in puncto Θ positum supponimus. Dicimus, centrum extrinsecus non cadere. Nam si fieri potest, duo puncta H , Θ , quae duo centra sunt, linea $H\Theta$ coniungimus. Ex III, 11 igitur manifestum est, lineam $H\Theta$ in utramque partem simul productam per punctum contactus transire; quare per duo puncta A , G transibit. Itaque eam ita ducamus, ut positio eius lineae eadem fiat ac positio lineae $AHZ\Theta G$. Linea igitur $AHZ\Theta G$ circum $AEGZ$ in pluribus punctis quam duobus secat. Quod fieri non posse, iam demonstraui. Itaque centrum circuli $ABGD$ extra circum $AEGZ$ non cadit. Eodem modo demonstrabimus, id in arcum AZG non cadere. Nam



ممكن اذن ان يقع مركز دائرة $\overline{أبجد}$ على محيط دائرة $\overline{أهزج}$ وقد
كنا بينا انه لا يقع ايضا خارجها فاذن يقع داخلها كما قال
الرياضي وذلك ما اردنا ان نبين .:

الشكل الثالث عشر من المقالة الثالثة

المخطوط المتساوية في دائرة فان بُعدها من المركز متساو
والمخطوط التي بُعدها من المركز متساو هي متساوية مثاله انه وقع
في دائرة $\overline{أب}$ خطا $\overline{جد}$ وهما متساويان فاقول ان بُعدهما من
المركز متساو برهانه انا نستخرج مركز الدائرة كما بين اخراجه
ببرهان ١ من ج وليكن نقطة $\overline{ح}$ ونخرج خطوط $\overline{حج}$ $\overline{حد}$ $\overline{حه}$ $\overline{حز}$
ونخرج من نقطة $\overline{ح}$ الى خطي $\overline{جد}$ $\overline{هز}$ عمودى $\overline{حط}$ $\overline{حك}$ كما بين
اخراجهما ببرهان يب من ١ فين اجل انه وقع في دائرة $\overline{أب}$ خطا
 $\overline{جد}$ $\overline{هز}$ وقد خرج من المركز اليهما عمودا $\overline{حط}$ $\overline{حك}$ فبين ببرهان
ج من ج انهما يقطعان خطي $\overline{جد}$ $\overline{هز}$ بنصفين فخط $\overline{طج}$ مثل خط
 $\overline{طد}$ و $\overline{كه}$ مثل $\overline{كز}$ فين اجل ان ضلع $\overline{حج}$ مثل ضلع $\overline{حه}$ وضلع
 $\overline{دج}$ مثل ضلع $\overline{زه}$ وقاعدة $\overline{حد}$ مساوية لقاعدة $\overline{حز}$ فانه بحسب برهان
ج من ١ تكون زاوية $\overline{دجح}$ مساوية لزاوية $\overline{زهح}$ ومن اجل ان خط
 $\overline{جد}$ مثل خط $\overline{هز}$ فان ايضا فهما متساوية فخط $\overline{جط}$ اذن مساو لخط
 $\overline{كه}$ و $\overline{حج}$ مثل $\overline{حه}$ وقد تبين ان زاوية $\overline{طجح}$ مساوية لزاوية $\overline{كهك}$
فبحسب برهان د من ١ تكون قاعدة $\overline{حط}$ مساوية لقاعدة $\overline{حك}$ ^{١)}

^{١)} In codice: مساوية لزاوية لقاعدة


si fieri potest, ut punctum Z cadat. Itaque una linea recta $AHZG$ ambitum circuli $AEGZ$ in pluribus punctis quam duobus secat, scilicet in punctis A, Z, G . Quod fieri non potest. Itaque ne hoc quidem fieri potest, ut centrum circuli $ABGD$ in ambitum circuli $AEGZ$ cadat. Sed iam demonstrauius, id extra eum non cadere. Ergo intra cadet, ut geometra dixit.*) Q. n. e. d.

Propositio XIII libri tertii.

In circulo linearum inter se aequalium a centro distantiae inter se aequales sunt, et lineae, quarum a centro distantiae inter se aequales sunt, inter se aequales sunt.

Exemplificatio. In circulo AB duae lineae GD, EZ inter se aequales positae sunt. Dico, earum a centro distantias inter se aequales esse.

Demonstratio. Centro circuli ex III, 1 sumpto, quod sit punctum H , lineas HG, HD, HE, HZ ducimus. A puncto H ad duas lineas GD, EZ ex I, 12 duas lineas $H\Theta, HK$ perpendiculares ducimus. Quoniam in circulo AB duae lineae GD, EZ positae sunt, et a centro ad eas duae perpendiculares $H\Theta, HK$ ductae sunt, ex III, 3 manifestum est, eas duas lineas GD, EZ in binas partes aequales secare; itaque $\Theta G = \Theta D$ et $E K = K Z$. Iam quoniam $HG = HE$ et $DG = ZE$ et basis HD basi HZ aequalis, ex I, 8 angulus DGH angulo ZEH aequalis erit. Et quoniam linea GD lineae EZ aequalis est, rursus illae duae [h. e. dimidia] inter se aequales sunt; itaque linea $G\Theta$ lineae EK aequalis est. Et $HG = HE$, demonstratum est autem, angulum ΘGH angulo HEK aequalem esse; ex I, 4 igitur basis $H\Theta$ basi HK aequalis erit. Quae



*) Supra p. 53.

وهما عمودان على خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ فهما اذن بُعدا خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ من نقطة $\overline{ح}$ التي هي مركز دائرة $\overline{أ ب}$ فبُعْدَا خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ من المركز متساويان وذلك ما اردنا ان نبين . . واقول ايضا اذا كان بُعْدُ خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ من المركز بُعْدًا متساويًا فانهما متساويان . . برهانه من اجل ان الابعاد التي للخطوط من المركز هي اعمدة على الخطوط وخطا $\overline{ح ط}$ $\overline{ح ك}$ قد خرجا من المركز وهما عمودان على خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ فهما اذن البعدان وهما متساويان فين اجل ان خطي $\overline{ح ط}$ $\overline{ح ك}$ خرجا من نقطة $\overline{ح}$ التي هي المركز الى خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ وقطعاهما على زوايا قائمة فبحسب برهان $\overline{ج}$ من $\overline{ج}$ فان كل واحد منهما يقطع خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ بنصفين على نقطتي $\overline{ط ك}$ فخط $\overline{د ج}$ مثلا خط $\overline{ج ط}$ وخط $\overline{ز ه}$ مثلا خط $\overline{ك ه}$ فلان زاويتي $\overline{ح ط ج}$ $\overline{ح ك ه}$ كل واحدة منهما قائمة فان بحسب برهان $\overline{م}$ من $\overline{أ}$ يكون مجموع مربعي خطي $\overline{ج ط}$ $\overline{ط ح}$ مساويا لمربع خط $\overline{ج د}$ وكذلك مجموع مربعي خطي $\overline{ح ك}$ $\overline{ك ه}$ مساو لمربع خط $\overline{ه ز}$ ولان خطي $\overline{ج د}$ $\overline{ه ز}$ متساويان لانهما خرجا من المركز الى المحيط يكون مجموع مربعي خطي $\overline{ح ط}$ $\overline{ط ج}$ مساويا لمجموع مربعي خطي $\overline{ح ك}$ $\overline{ك ه}$ لكن مربع خط $\overline{ح ط}$ مساو لمربع خط $\overline{ح ك}$ فاذا اسقطناهما بقي مربع خط $\overline{ط ج}$ مساويا لمربع خط $\overline{ك ه}$ فخط $\overline{ط ج}$ اذن مساو لخط $\overline{ك ه}$ وكنا بينا ان خط $\overline{د ج}$ ضعف خط $\overline{ط ج}$ وخط $\overline{ز ه}$ ضعف خط $\overline{ك ه}$ فالاشياء التي هي اضعاف متساوية لاشياء متساوية فهي متساوية فخط $\overline{د ج}$ اذن مساو لخط $\overline{ز ه}$ وذلك ما اردنا ان نبين . .

أما زيادة ايرُن في هذا الشكل فانه بين ان مركز الدائرة ⁴⁰ $\overline{أ}$

ad duas lineas GD , EZ perpendiculares sunt; quare distantiae sunt duarum linearum GD , EZ a puncto H , quod centrum circuli AB est. Ergo duarum linearum GD , EZ a centro distantiae inter se aequales sunt. Q. n. e. d.

Dico etiam, duas lineas GD , EZ , si earum a centro distantiae aequales sint, inter se aequales esse.

Demonstratio. Quoniam linearum a centro distantiae ad lineas perpendiculares sunt, et duae lineae $H\Theta$, HK a centro ductae ad duas lineas GD , EZ perpendiculares sunt, distantiae sunt linearum et inter se aequales. Et quoniam duae lineae $H\Theta$, HK a puncto H , quod centrum est, ad duas lineas GD , EZ ductae eas ad angulos rectos secant, ex III, 3 utraque duas lineas GD , EZ in duas partes aequales ad duo puncta Θ , K secat; itaque $DG = 2 G\Theta$ et $ZE = 2 KE$. Iam quoniam uterque angulus $H\Theta G$, HKE rectus est, ex I, 46 summa duorum quadratorum duarum linearum $G\Theta$, ΘH quadrato lineae HG aequalis est, et eodem modo summa duorum quadratorum duarum linearum HK , KE quadrato lineae HE aequalis est. Et quoniam duae lineae HG , HE inter se aequales sunt, quippe quae a centro ad ambitum ductae sint, summa duorum quadratorum duarum linearum $H\Theta$, ΘG summae duorum quadratorum duarum linearum HK , KE aequalis erit. Sed quadratum lineae $H\Theta$ quadrato lineae HK aequale est; quibus subtractis relinquitur quadratum lineae ΘG quadrato lineae KE aequale; itaque $\Theta G = KE$. Sed iam demonstraui, lineam DG linea ΘG duplo maiorem esse et lineam ZE linea KE duplo maiorem esse. Quae autem magnitudinibus aequalibus duplo maiora sunt, inter se aequalia sunt. Ergo $DG = ZE$. Q. n. e. d.

Hero in additamentis ad hanc propositionem demonstraui, centrum circuli inter duas lineas EZ . GD cadere ideoque circum ABGD delineauit et in eo duas lineas AB , GD ita duxit, ut inter se aequales essent. Dixit igitur, fieri non posse, ut cen-

يقع بين خطي^{١)} $\overline{هز}$ $\overline{جد}$ ورسم لذلك صورة دائرة $\overline{أبجد}$ واخرج فيها خطي $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ وهما متساويان فقال ان مركز هذه الدائرة يقع بين خطي $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ لا يمكن غيره فان امكن فليقع أولاً على خطي $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ فننزل انّه قد وقع على خط $\overline{جد}$ على نقطة $\overline{ه}$ ونخرج خطي $\overline{هأ}$ $\overline{هب}$ فمن اجل ان نقطة $\overline{ه}$ مركز فان خط $\overline{هأ}$ مساو لخط $\overline{هب}$ وخط $\overline{هأ}$ مساو لخط $\overline{هب}$ لكن بحسب برهان $\overline{كمن}$ ا فان مجموع خطي $\overline{هأ}$ $\overline{هب}$ كخط واحد اعظم من خط $\overline{أب}$ فخط $\overline{جد}$ اذن اعظم من خط $\overline{أب}$ وكنا فرضناهما متساويين هذا خلف وبمثل هذا يتبين انه ولا يمكن ان يقع على خط $\overline{أب}$ فاذن ليس مركز دائرة $\overline{أبجد}$ على احد خطي $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ فاقول ايضا انه ولا خارجاً عن احد خطي $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ فان امكن فليكن خارجاً عن خط $\overline{جد}$ وننز [ل اذ]ه نقطة $\overline{ز}$ ونخرج خطوط $\overline{زأ}$ $\overline{زب}$ $\overline{زأ}$ $\overline{زب}$ فمن اجل ان نقطة $\overline{ز}$ مركز الدائرة فان الخطوط الخارجة منها الى المحيط متساوية فخطا $\overline{زأ}$ $\overline{زب}$ مثل خطي $\overline{زأ}$ $\overline{زب}$ وقاعدة $\overline{أب}$ مساوية لقاعدة $\overline{دج}$ فبحسب برهان $\overline{ح من}$ ا تكون زاوية $\overline{أزب}$ مساوية لزاوية $\overline{دزج}$ الاصغر مساوية لـ $\overline{أعظم}$ هذا خلف وبمثل هذا البرهان يتبين انه غير ممكن ان يقع ايضا خارج خط $\overline{أب}$ فقد تبين ان مركز دائرة $\overline{أبجد}$ ليس يقع الا فيما بين خطي $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ وذلك ما اردنا ان نبين . . . ويتبين ايضا ان مركز دائرة $\overline{أبجد}$ يقع بين خطي $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ المتساويين بغير طريق الخلف فقال ليس يخلو من ان يكون خطا $\overline{أب}$ $\overline{جد}$ متوازيين او غير متوازيين فلننزل انهما متوازيان أولاً ونصل بين خطي $\overline{أب}$ $\overline{دج}$

^{١)} Supra in margine clarius scriptum.

trum huius circuli inter duas lineas AB , GD non cadat. Nam si fieri potest, prius in duabus lineis AB , GD cadat, et supponimus, id in linea GD in puncto E cadere. Duas lineas EA , EB ducimus. Quoniam punctum E centrum est, linea AE lineae ED aequalis erit et $BE = EG$. Sed ex I, 20 summa duarum linearum AE , EB coniunctarum maior erit quam linea AB . Itaque linea GD linea AB maior erit. At eas inter se aequales supposuimus. Quod absurdum est.


Eodem modo demonstramus, fieri non posse, ut in linea AB cadat. Ergo centrum circuli $ABGD$ in alterutra linearum AB , GD non cadit.

Rursus dico, id extra alterutram linearum AB , GD non cadere. Nam si fieri potest, extra lineam GD cadat, et supponimus, id esse punctum Z .

Lineas ZD , ZG , ZA , ZB ducimus. Quoniam punctum Z centrum est circuli, lineae ab eo ad ambitum ductae inter se aequales sunt; itaque duae lineae ZA , ZB duabus lineis ZD , ZG aequales sunt. Et basis AB basi DG aequalis est; itaque ex I, 8 angulus AZB angulo DZG aequalis est, minor maiori. Quod absurdum est.

Eodem modo demonstrabimus, fieri non posse, ut extra lineam AB cadat.

Ergo iam demonstratum est, centrum circuli $ABGD$ non cadere nisi in spatium inter duas lineas AB , GD positum. Q. n. e. d.




Hero etiam reductione in absurdum non adhibita demonstravit, centrum circuli $ABGD$ inter duas lineas inter se aequales AB , GD cadere. Dixit enim, fieri non posse, quin duae lineae AB , GD aut inter se parallelae sint aut non parallelae. Prius supponamus, eas inter se parallelas esse. Duas lineas AB , DG duabus lineis AG , DB coniungimus; quare anguli al-

بخطى $\overline{ا د ب}$ فالزوايا المتبادلة اذن متساوية فزاوية $\overline{ا}$ مساوية لزاوية $\overline{ج د و}$ زاوية $\overline{د}$ مساوية لزاوية $\overline{ب}$ وقاعدة $\overline{ا ب}$ مساوية لقاعدة $\overline{د ج}$ فبحسب برهان $\overline{ك و م}$ $\overline{ا}$ يكون ضلع $\overline{ا ه}$ مساويا لضلع $\overline{ه ج}$ وضلع $\overline{ه ج}$ مساويا لضلع $\overline{ه د}$ فخطا $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ تقاطعا على انصافهما على نقطة $\overline{ه}$ فبتين ببرهان $\overline{د م ج}$ ان مركز الدائرة على خطى $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ فالمركز اذن نقطة $\overline{ه}$ وذلك ما اردنا ان نبين . وننزل ايضا ان خطى $\overline{ا ب}$ $\overline{ج د}$ غير متوازيين ونُخرجهما على استقامة حتى يلتقيا فليلتقيا على نقطة $\overline{ه}$ ونُخرج خطى $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ يتقاطعان على نقطة $\overline{ز}$ ونُخرج خط $\overline{ه ز}$ فاقول ان مركز الدائرة على خط $\overline{ه ج}$ برهانه من اجل ان زاوية $\overline{ب ا ج}$ مساوية لزاوية $\overline{ب د ج}$ لانهما في قطعة واحدة وتوترهما قوس واحدة وهى قوس $\overline{ب د ج}$ ومثل هذه الاشكال يُستشهد بها وان كانت مرسومة من بعد لانه¹⁾ ليس فيها مقدمات تتلو هذا الشكل ولا هذا الشكل من الاوائل لذلك الشكل لكن اوائل ذلك الشكل مأخوذة من المقالة الاولى ومن الشكل الاول من هذه المقالة فمن اجل ذلك لما احتاج ايرن الى حل هذه الشكوك جعل الشكل العشرين من هذه المقالة اولا لهذا الشكل الثالث عشر فقال من اجل ان زاوية $\overline{ب ا ج}$ مساوية لزاوية $\overline{ب د ج}$ وزاوية $\overline{ا ب د}$ مساوية لزاوية $\overline{ا ج د}$ لانهما ايضا في قطعة $\overline{ا ب ج د}$ وتوترهما قوس واحدة وهى قوس $\overline{ا د}$ وضلع $\overline{ا ب}$ مساو لضلع $\overline{ج د}$ فانه بحسب برهان $\overline{ك و م}$ $\overline{ا}$ يكون خط $\overline{ا ز}$ مساويا لخط $\overline{ز د}$ وايضا من اجل ان زاوية $\overline{ا ب د}$ مساوية لزاوية $\overline{ا ج د}$ لانهما في قطعة $\overline{ا ب ج د}$ وتوترهما قوسا

¹⁾ In margine clarius scriptum.

terni inter se aequales sunt, $\angle A = G$ et $\angle D = B$. Et basis AB basi DG aequalis; itaque ex I, 26 latus AE lateri EG aequale est et latus ED [scr. EB] lateri ED . Duae igitur lineae AG , BD in binas partes aequales inter se secant in puncto E . Itaque ex III 4 sequitur, centrum circuli in duabus lineis AG , DB esse. Ergo centrum punctum E erit. Q. n. e. d.



Rursus supponamus, duas lineas AB , GD parallelas non esse. Eas in directum producimus, donec concurrant, concurrantque in puncto E . Ductis duabus lineis AG , BD , quae in puncto Z inter se secant, lineam EZH ducimus. Dico, centrum circuli in linea EH esse.


Demonstratio. Quoniam angulus BAG angulo BDG aequalis est, quia in eodem segmento positi sunt, et idem arcus, scilicet arcus BDG (scr. BHG) iis oppositus est — eiusmodi enim propositionibus demonstratio perficitur, etiam si postea demum explicatae sunt, quia in ea [III, 20 nostri, in Graecis III, 21] demonstranda nihil adhibetur eorum, quae hanc propositionem [13] sequuntur, nec haec propositio inter elementa illius est, sed elementa illius e libro primo primaeque propositione huius libri petita sunt. Qua de causa Hero, cum hae dubitationes ei soluendae essent, propositionem XX huius libri ante hanc XIII collocavit et sic dicit: Quoniam $\angle BAG = BDG$, et $\angle ABD = AGD$, quoniam uterque in segmento $ABGD$ positus est, et iis idem arcus, scilicet arcus AD , oppositus est, et latus AB lateri GD aequale est, ex I, 26 linea AZ lineae ZD aequalis erit. Rursus, quoniam $\angle DBG = AGB$, quoniam in segmento DGB positi sunt, et duo arcus DG , AB inter se aequales iis oppositi sunt, et iam demonstratum est, angulum DGA angulo DBA aequalem esse, totus angulus DGB toti angulo ABG aequalis erit. Itaque ex I, 6 triangulus EGB aequicrurius est, et $EG = EB$. Supponimus autem, esse $DG = AB$. Ergo quae relinquitur, ED lineae

دج $\overline{أب}$ المتساويان وقد تبين أن زاوية دجا مثل زاوية دبا فان
 زاوية دجب $\overline{باسرها}$ مساوية لزاوية $\overline{أبج}$ $\overline{باسرها}$ فاذن بحسب برهان
 و من ا يكون مثلث $\overline{هـجـب}$ متساوي الساقين ساق $\overline{هـجـ}$ مثل ساق
 $\overline{هـب}$ وقد فرضنا دج مثل $\overline{أب}$ فيكون $\overline{هـد}$ الباقي مثل $\overline{هـا}$ وايضا من
 اجل ان زاوية $\overline{هـاج}$ مساوية لزاوية $\overline{هـدب}$ وذلك بحسب برهان لب من
 ا وضلعا $\overline{هـد}$ دز مثل ضلعي $\overline{هـا}$ از فبحسب برهان د من ا تكون
 زاوية $\overline{دهز}$ مساوية لزاوية $\overline{هـز}$ فخط $\overline{هـب}$ اذن مساو لخط $\overline{هـج}$ وزاوية
 $\overline{ب هـ ط}$ قد تبين انها مساوية لزاوية $\overline{ج هـ ط}$ وناخذ خط $\overline{هـط}$ مشتركا
 وضلعا $\overline{ج هـ ط}$ مساويان لضلعي $\overline{ب هـ ط}$ وزاوية $\overline{ج هـ ط}$ مساوية
 لزاوية $\overline{ب ج ط}$ فقاعدة $\overline{ب ط}$ مساوية لقاعدة $\overline{ج ط}$ وزاوية $\overline{هـط ب}$ مساوية
 لزاوية $\overline{هـط ج}$ فهما اذن قائمتان فخط $\overline{ب ج}$ قد وقع في دائرة $\overline{أ ب د}$
 وقد جاز عليه خط $\overline{هـط}$ وقسمه بنصفين وعلى زوايا قائمة فبحسب
 برهان ج من ج فان على خط $\overline{هـز}$ يكون مركز الدائرة وذلك ما اردنا
 ان نبين .: وقال ايضا فان قال قائل ان الخطيين المتساويين
 يتقاطعان داخل دائرة $\overline{أ ب د}$ على علامة $\overline{هـ}$ كخطي $\overline{أ ج ب د}$
 (المشترك)¹⁾ فاننا نقول ان المركز لا يخلو من ان يكون على تقاطع
 خطي $\overline{أ ج ب د}$ المشترك لهما اعني علامة $\overline{هـ}$ او على غيرها فان وقع
 على علامة $\overline{هـ}$ فهو اذن بين خطي $\overline{أ ج ب د}$ وقد انحلّ المطلب وقد
 بينا انه لا يقع على احد خطي $\overline{أ ب ج د}$ فان قال قائل انا نفرض
 خطي $\overline{أ ب ج د}$ غير متقاطعين في داخل دائرة $\overline{أ ب د}$ لكن متلاقيين
 على محيطها كخطي $\overline{أ ب د}$ فاننا نبين ان مركز دائرة $\overline{أ ب د}$ بين

¹⁾ A librario erasum.

EA aequalis est. Rursus quoniam ex I, 32¹⁾ $\angle EAG = EDB$, et duo latera ED , DZ duobus lateribus EA , AZ aequalia sunt, ex I, 4 erit $\angle DEZ = AEZ$. Erat autem $EB = EG$.²⁾ Et iam demonstratum est, angulum $BE\theta$ angulo $GE\theta$ aequalem esse; linea igitur $E\theta$ communi sumpta duo latera EG , $E\theta$ duobus lateribus BE , $E\theta$ aequalia erunt. Et $\angle [G]E\theta = BG\theta$ [scr. $BE\theta$]; itaque basis $B\theta$ basi $G\theta$ aequalis erit, et $\angle E\theta B = E\theta G$. Quare recti sunt. Itaque linea BG in circulo $ABGD$ posita est, et linea $E\theta$ eam secans in duas partes aequales et ad angulos rectos eam secat. Ergo ex III, 3 centrum circuli in linea EZ [scr. EH] posita est. Q. n. e. d.

Dixit etiam: Si quis dixerit, duas lineas inter se aequales intra circulum $ABGD$ in puncto E inter se secare, ut duae lineae AG , BD , dicimus, fieri posse, ut centrum aut in communi sectione duarum linearum



¹⁾ In margine est: قلت انا ويمكن ان يبرهن بوجه اخر احسن
من هذا وهو ان زاوية $\angle EAG$ مساوية لزاوية $\angle EDB$ و ضلع \overline{ED} قد
تبين انه مثل ضلع \overline{EA} ونجعل زاوية $\angle DEZ$ مشتركة فمبرهان
كو من ا يكون ضلع \overline{ED} مثل ضلع \overline{EA} ثم نجعل \overline{EZ} مشتركا
ودز قد تبين انه مثل \overline{AG} فمبرهان ح من ا تكون زاوية $\angle DEZ$
مثل زاوية $\angle AEZ$

Dico, hoc alio modo pulchriore demonstrari posse. Nam quoniam $\angle EGA = EBD$, et iam demonstratum est, latus AG lateri DB aequale esse, angulo DEA communi sumpto ex I, 26 latus ED lateri EA aequale erit. Deinde EZ communem sumimus, et iam demonstratum est, DZ aequalem esse AZ . Itaque ex I, 8 $\angle DEZ = AEZ$.


²⁾ In textu: Ergo $EB = EG$.

خطى $\overline{اب}$ $\overline{اد}$ ونخرج خط $\overline{بد}$ ونقسمه بنصفين على علامة $هـ$ ونخرج
 $اه$ ونخرجه الى محيط الدائرة الى نقطة $ح$ فاقول ان مركز الدائرة على
خط $\overline{اج}$ برهانه ان مثلث $\overline{ابد}$ متساوى الساقين فبحسب برهان
 $هـ$ من $ا$ تكون زاوية $\overline{ابد}$ مساوية لزاوية $\overline{ادب}$ وكنا فرضنا خط $\overline{اب}$
مثل خط $\overline{اد}$ وفصلنا $\overline{به}$ مثل $\overline{هـد}$ فصلنا $\overline{اد}$ $\overline{ده}$ مثل ضلعي $\overline{اب}$ $\overline{به}$
وزاوية $\overline{ب}$ مثل زاوية $\overline{د}$ فمثلث $\overline{اده}$ مثل مثلث $\overline{ابه}$ وزاوية $\overline{اهب}$ مثل
زاوية $\overline{اذه}$ فقد جاز خط $\overline{اج}$ على خط $\overline{بد}$ وقسمه بنصفين على نقطة
 $هـ$ وعلى زوايا قائمة فبحسب برهان $ج$ من $ج$ فانه على خط $\overline{اج}$
يكون مركز الدائرة وذلك ما اردنا ان نبين .


الشكل الرابع عشر من المقالة الثالثة

الخطوط المستقيمة الواقعة في دائرة اعظمها قطر الدائرة والباقيّة
فما كان منها اقرب الى المركز فهو اعظم ممّا بعد عنه مثاله ان
دائرة $\overline{اب}$ وقع فيها خطوط $\overline{جد}$ $\overline{هـز}$ $\overline{حط}$ وخط $\overline{جد}$ قطر الدائرة وخط
 $\overline{هـز}$ اقرب الى المركز من خط $\overline{حط}$ فاقول ان اعظمها خط $\overline{جد}$ وخط
 $\overline{هـز}$ اعظم من خط $\overline{حط}$ برهانه انا ننزل ان المركز نقطة $ك$ ونخرج
41 u. منها الى خطى $\overline{هـز}$ $\overline{حط}$ عمودى $\overline{كل}$ $\overline{كم}$ كما بينا اخراجهما ببرهان
يب من $ا$ فبين اجل ان خط $\overline{هـز}$ اقرب الى المركز من خط $\overline{حط}$ فان
عمود $\overline{كم}$ اعظم من عمود $\overline{كل}$ فنفصل من خط $\overline{كم}$ مثل خط
 $\overline{كل}$ كما بين ببرهان $ب$ من $ا$ وليكن خط $\overline{كن}$ ونجيز على نقطة
 $ن$ خط $\overline{سن}$ موازيا لخط $\overline{طح}$ كما بين ببرهان $لا$ من $ا$ فخط $\overline{كن}$
عمود على خط $\overline{سح}$ واذا كانت ابعاد الخطوط من المركز متساوية

AG , BD sit, hoc est in puncto E , aut in alio puncto. Iam si in puncto E cadit, inter duas lineas AG , BD positum est, et solutum erit, quod quaerebatur. Sed iam demonstrauius, id in alterutra linearum AB , GD non cadere.*)



Si quis dixerit, hoc quoque supponi posse, duas lineas AB , GD non intra circulum $ABGD$ inter se secare, sed in ambitu eius concurrere, ut duae lineae AB , AD , demonstrauius, centrum circuli $ABGD$ inter duas lineas AB , AD esse. Lineam BD ducimus eamque in puncto E in duas partes aequales diuidimus. [Linea] AE ad ambitum circuli ad punctum H [scr. G] producta dico, centrum circuli in linea AG esse.



Demonstratio. Triangulus ABD aequicrurius est; quare ex I, 5 $\angle ABD = \angle ADB$. Lineam AB lineae AD aequalem supposuimus, et BE abscidimus [lineae] ED aequalem; duo igitur latera AD , DE duobus lateribus AB , BE aequalia sunt, et $\angle B = \angle D$. Itaque triangulus AED triangulo ABE aequalis est, et $\angle AEB = \angle AED$. Quare linea AG lineam BD transiens in puncto E in duas partes aequales et ad angulos rectos eam secat. Ergo ex III, 3 centrum circuli in linea AG erit. Q. n. e. d.

Propositio XIV libri tertii.¹⁾

Linearum rectarum in circulum cadentium maxima est diameter circuli, ceterarum autem, quae centro propior est, remotiore maior.

*) Haec non intellego; sed eadem habet Gherardus p. 128, 2--3.

¹⁾ In figura codicis desunt litterae Γ , ϵ , ω . τ bis scriptum.

فإنَّ الأعمدة التي تخرج إلى الخطوط من المركز تكون متساوية وإذا كانت الأعمدة متساوية فإن الخطوط متساوية فخط $\overline{هز}$ مساو لخط $\overline{سع}$ وتخرج خطوط $\overline{كس}$ $\overline{كع}$ $\overline{كح}$ $\overline{كط}$ فمن أجل أن كل مثلث فإن كل ضلعين من أضلاعه مجموعين لخط واحد أعظم من الضلع الثالث وذلك بين ببرهان $\overline{ك}$ من $\overline{ا}$ [ف]ضلعا $\overline{كس}$ $\overline{كع}$ مجموعين لخط واحد أعظم من خط $\overline{سع}$ لكن خط $\overline{كس}$ مساو لخط $\overline{كج}$ وخط $\overline{كع}$ مساو لخط $\overline{كد}$ فخطا $\overline{كس}$ $\overline{كع}$ لخط واحد مساو لقطر الدائرة الذي هو خط $\overline{جد}$ فخط $\overline{جد}$ اذن أعظم من خط $\overline{سع}$ لكن خط $\overline{سع}$ مساو لخط $\overline{هز}$ فخط $\overline{جد}$ الذي هو القطر أعظم من خط $\overline{هز}$ وأيضا فمن أجل أن خطي $\overline{كس}$ $\overline{كع}$ مساويان لخطي $\overline{كح}$ $\overline{كط}$ لانهما خارجة من المركز إلى المحيط وزاوية $\overline{سكع}$ أعظم من زاوية $\overline{حكط}$ فببرهان $\overline{كد}$ من $\overline{ا}$ تكون قاعدة $\overline{سع}$ أعظم من قاعدة $\overline{حط}$ لكن خط $\overline{سع}$ مساو لخط $\overline{هز}$ فخط $\overline{هز}$ الأقرب إلى المركز أعظم من خط $\overline{طح}$ الأبعد عنه وقد بينّا أن قطر الدائرة وهو $\overline{جد}$ أعظم من خط $\overline{هز}$ فقد ظهر أنه إذا وقع في دائرة خطوط مستقيمة فاعظمها قطر الدائرة والباقيّة فما قُرب منها من مركز الدائرة أعظم ممّا بَعُد عنه وذلك ما أردنا أن نبين .

الشكل الخامس عشر من المقالة الثالثة

كل دائرة يخرج من طرف قطرها خط مستقيم على زاوية قائمة فانه يقع خارج الدائرة ولا يقع بينه وبين الخط المحيط

بالدائرة خطاً آخر مستقيم وكل خط هذه حاله^{١)} فهو مماسٌ
للدائرة وتكون الزاوية التي يحيط بها ذلك الخط والخط المحيط
اصغر من كل زاوية حادة والتي تليها من داخل الدائرة التي
تُحيط بها القطر والخط^{٢)} المحيط اعظم من كل زاوية حادة
مثاله ان دائرة اجد قطرهما جد وقد خرج من نقطة د التي هي
طرف القطر خطاً على زاوية قائمة وهو خط دز فاقول انه يقع خارج
الدائرة لا يمكن غير ذلك فان امكن ان يقع في داخل الدائرة
فليكن مثل خط دا ونُخرج خط هـ فمثلث ا هـ د متساوي الساقين
لان خط هـ ا مثل خط هـ د لانهما خرجا من المركز الى المحيط
فببرهان هـ من ا تكون زاوية هـ ا د مساوية لزاوية هـ د ا لكن زاوية هـ د ا
فرضاها قائمة فزاوية هـ ا د اذن قائمة فمثلث هـ ا د فيه زاويتان
قائمتان وذلك غير ممكن لانه قد تبين ببرهان يز من ا ان كل
زاويتين من زوايا كل مثلث اذا جُمعتا اصغر من قائمتين فقد
تبين ان الخط القائم على نقطة د على زاوية قائمة يقع خارج
الدائرة فليقع مثل خط دز واقول ايضا انه لا يقع بينه وبين قوس
جاد خط اخر فان امكن فليقع مثل خط دح فين اجل ان زاوية
هـ دز قائمة فيان زاوية هـ دح اصغر من قائمة فقد يمكن اذن ان يخرج
الى خط دح من نقطة هـ خط قائم عليه على زوايا قائمة فلنخرج
خط هـ ط فين اجل ان زاوية هـ ط د اعظم من زاوية هـ د ط والزاوية

^{١)} In margine clarius scriptum.

^{٢)} In codice: الخط والقطر

est, si lineae rectae in circulum cadant, maximam earum esse diametrum circuli, ceterarum autem, quae centro circuli propiores sint, remotiore maiores. Q. n. e. d.

Propositio XV libri tertii.

In circulo linea recta a termino diametri ad angulum rectum ducta extra circulum cadet, neque inter eam et ambitum circuli alia linea recta cadit, (omnesque lineae, quarum positio haec est, circulum contingunt,*) et angulus, qui hac linea et ambitu comprehenditur, quouis angulo acuto minor est, angulus uero in circulo deinceps positus, qui diametro et ambitu comprehenditur, quouis angulo acuto maior est.

Exemplificatio. In circulo AGD diametrus est GD . A puncto D , quod terminus diametri est, linea DZ ad rectum angulum ducitur. Dico, eam extra circulum cadere, nec aliter fieri posse.

Nam, si fieri potest, ut intra circulum cadat, sit ut linea DA . Linea EA ducta triangulus AED aequicrurius erit; nam $EA = ED$, quia utraque a centro ad ambitum ducta est; quare ex I, 5 $\angle EAD = \angle EDA$. Sed angulum EDA rectum supposuimus; quare etiam angulus EAD rectus est. Itaque in triangulo EAD duo anguli recti sunt. Quod fieri non potest, quoniam iam in I, 17 demonstraui, in quouis triangulo summam duorum angulorum duobus rectis minorem esse. Ergo demonstratum est, lineam ad punctum D ad rectum angulum ductam extra circulum cadere.

Cadat ut linea DZ . Rursus dico, inter eam et arcum GAD nullam aliam rectam cadere. Nam, si fieri potest, cadat ut linea DH . Iam quoniam angulus EDZ rectus est, angulus EDH recto minor erit. Itaque fieri potest, ut a puncto E ad lineam

*) Haec uerba, quae apud Euclidem desunt, ad corollarium Euclidis spectant (p. 71).


العظمى يوترها الضلع الاعظم وذلك بحسب برهان يط من ا يكون
خط $\overline{هـ}$ اعظم من خط $\overline{ط}$ لكن خط $\overline{هـ}$ مساو لخط $\overline{ك}$ لانهما
خرجا من المركز الى المحيط فخط $\overline{ك}$ اذن اعظم من خط $\overline{ط}$
الاصغر اعظم من الاعظم هذا خلف فقد ظهر انه لا يقع بين خط¹⁾
دز وبين قوس دا خط اخر مستقيم وايضا فاقول ان زاوية كدز
الخارجة اصغر من كل زاوية حادة وان زاوية $\overline{هـك}$ الداخلة اعظم
من كل زاوية حادة برهانه ان لو كانت زاوية $\overline{ك}$ دز الخارجة مثل
زاوية حادة او اعظم من حادة لكان يقع بين قوس $\overline{اك}$ وبين
خط دز خط اخر مستقيم فين اجل ما قد تبين انه لا يمكن ان
يقع بينهما خط اخر مستقيم صارت اصغر من كل زاوية حادة
وصارت زاوية نصف الدائرة التي تحيط بها قوس جاد وقطر جـهـ
اعظم من كل زاوية حادة وعندها يتبين ان كل خط مستقيم
يخرج من طرف قطر الدائرة على زاوية قائمة فانه ماس للدائرة
وذلك ما اردنا ان نبين .: قال النريزى اراد الرياضى ان الزاوية
التي تحيط بها قوس جاد وعمود دز اصغر من كل زاوية حادة لانها
غير منقسمة فلو كانت منقسمة لوقع بين قوس جاد وبين خط
دز خط اخر مستقيم اذ²⁾ كان قسمة الزوايا³⁾ انما تكون بالخطوط
المستقيمة التي تفصلها فلما لم تنفصل زاوية كدز لم تكن براوية
حادة لان الزوايا الحادة كلها تنقسم فسمّاها باسم اضطرّة الامر اليه

¹⁾ In textu: خطى

²⁾ Primum librarius scripsit: دز

³⁾ Primum librarius scripsit: الزوية

DH linea ad rectos angulos ducatur. Lineam $E\Theta$ ducamus. Quoniam $\angle E\Theta D > ED\Theta$, et ex I, 19 latus maius angulo maiori oppositum est, linea ED maior erit linea $E\Theta$. Sed $ED = EK$, quoniam utraque a centro ad ambitum ducta est; itaque $EK > E\Theta$, minor maiore maior. Quod absurdum est. Ergo manifestum est, inter lineam DZ et arcum DA nullam aliam lineam rectam cadere.



Rursus dico, angulum KDZ exteriorem quouis angulo acuto minorem esse, et angulum EDK interiorem quouis angulo acuto maiorem.

Demonstratio. Si angulus KDZ extrinsecus positus aut angulo acuto aequalis aut angulo acuto maior est, inter arcum AKD et lineam DZ alia linea recta cadit. Itaque, quoniam iam demonstratum est, fieri non posse, ut inter ea alia recta cadat, quouis angulo acuto minor erit, et ideo angulus semicirculi arcu GAD et diametro GED comprehensus quouis angulo acuto maior erit.

Hinc demonstratur, omnem lineam rectam a termino diametri circuli ad angulum rectum ductam circulum tangere. Q. n. e. d.

Dixit Al-Narizi. Geometra uult, angulum arcu GAD et perpendiculari DZ comprehensum quouis angulo acuto minorem esse, quia diuidi non potest. Si enim diuidi possit, inter arcum GAD et lineam DZ alia recta linea cadat, quia anguli non diuiduntur nisi lineis rectis, quae eos secant. Sed quum angulus KDZ secari non possit, non erit angulus acutus; nam omnes anguli acuti diuiduntur. Sed eo nomine eum adpellauit, quod res postulauit, propter reliquum angulum interiorem, scilicet quia $\angle EDZ$ rectus est, et inter lineam GD et DZ perpendicularem arcus GA cadit et angulus KDZ abscinditur, cui magnitudo non est; relinquitur igitur angulus interior, qui diametro GD et arcu

بسبب الزاوية الاخرى الداخلة وذلك ان زاوية $\overline{هـ د ز}$ لها^{١)} كانت قائمة ووقع بين خط $\overline{ج د}$ وعمود $\overline{د ز}$ قوس $\overline{ج ا}$ وفصلت زاوية $\overline{ك د ز}$ لا مقدار لها بقيت الزاوية الداخلة التي يحيط بها قطر $\overline{ج د}$ وقوس $\overline{ج ا}$ اعظم من كل زاوية حادة لان الحادة هي التي تنقص عن الزاوية القائمة بزاوية ما اخرى حادة فمن اجل ان هذه الزاوية الداخلة لم تنقص عن الزاوية القائمة التي هي زاوية حادة بزاوية لها مقدار .
نسب الرياضى الزاوية الداخلة الى انها اعظم من كل زاوية حادة ومن اجل ان الزاوية الخارجة لا يمكن ان تنقسم بخط مستقيم فان كل خط حالة هذه الحال فهو مماس للدائرة .

الشكل السادس عشر من المقالة الثالثة

نريد ان نبين كيف نخرج من نقطة مفروضة خطا مستقيما يماس دائرة مفروضة فننزل ان النقطة المفروضة نقطة $\overline{ا}$ والدائرة المفروضة دائرة $\overline{ب ج}$ فنستخرج مركز الدائرة وليكن نقطة $\overline{د}$ ونصل بين نقطتي $\overline{د ا}$ بخط $\overline{د ا}$ يقطع الدائرة على نقطة $\overline{ز}$ ونجعل نقطة $\overline{د}$ مركزا ونخط ببعد $\overline{د ا}$ ^{٢)} دائرة $\overline{ا ه}$ ونقيم على نقطة $\overline{ز}$ من خط $\overline{اد}$ خطا يكون عمودا عليه ونخرجه الى ان يلقي دائرة $\overline{ا ه}$ كما بينا

^{١)} In codice لِعَل (!), suspicor autem scribendum esse لَهَا. Apud Gherardum Crem. p. 129, 16 pro quod < si > scribendum quia, sicut habet cod. Reginensis lat. 1268 (cfr. Biblioth. mathm. III, p. 72 not.), de cuius scriptura beneuolenter nos certiores fecit A. A. Bjørnbo, dr. phil.

^{٢)} Post haec uerba librarius falso repetiuit, postea erasit uerba, quae sunt: بخط $\overline{د ا}$ مركزا ونخط

GAD comprehenditur, quouis angulo acuto maior, quia angulus acutus est, qui de angulo recto diminuitur alio angulo acuto, et quoniam hic angulus interior de angulo recto non diminuitur acuto angulo, cui magnitudo est¹⁾, geometra angulum interiorem quouis angulo acuto maiorem esse a principio statuit.

Et quoniam fieri non potest, ut angulus extrinsecus positus linea recta diuidatur, omnis linea, cuius positio haec est, circum contingit.

Propositio XVI libri tertii.

Demonstrare uolumus, quo modo a puncto dato lineam rectam circum datum contingentem ducamus.

Supponamus, punctum datum esse punctum *A* et circum datum circum *BG*. Centrum circuli sumimus, quod sit punctum *D*, et duo puncta *D*, *A* linea *DA* coniungimus, quae circum in puncto *Z* secat. Puncto *D* centro sumpto radio *DA* circum *AE* describimus et in puncto *Z* lineae *AD* lineam ad eam perpendicularem erigimus ex I, 11 et eam producimus, dum ad circum *AE* perueniat, sitque linea *ZH*. Itaque ex III, 15 manifestum est, lineam *ZH* extra circum *BG* cadere et circum contingere.

Punctis *D*, *H* coniunctis linea *DH*, quae circum *BG* in puncto Θ secat, duo puncta *A*, Θ linea *A Θ* coniungimus. Quoniam *DA* = *DH*, quippe quae a centro ad ambitum ductae sint, et *DZ* = *D Θ* , duo latera *AD*, *D Θ* duobus lateribus *HD*, *DZ*

¹⁾ In textu Arabico est: «... non diminuitur de angulo recto, qui angulus acutus est, angulo, cui magnitudo est.» Apud Gher. Crem. (p. 129, l. 28) est: «... non minuitur a recto angulo, qui est edz, cum angulo, cui sit quantitas.» Credo, ordinem modo uerborum Arabicorum mutatum esse, et ita legendum esse: القائمة بزواية لها


مقدار التي هي زاوية حادة

اخراجة ببرهان يا من ا وليكن خط زح فين البين بحسب برهان
 به من ج ان خط زح يقع خارج دائرة بـ ج وهو مماس للدائرة
 ونصل بين نقطتي دح بخط دح يُقطع دائرة بـ ج على نقطة ط
 ونصل نقطتي ا ط بخط ا ط فلان خط دا مساو لخط دح لانهما
 خرجا من المركز الى المحيط وخط دز مثل خط دط فان خطي اد
 دط مساويان لخطي ح د دز كل ضلع مساو لنظيرة وزاوية ادط
 مشتركة للمثلثين فان بحسب برهان د من ا تكون قاعدة ا ط
 مساوية لقاعدة ح ز ومثلث ادط مساويا لمثلث ح دز وسائر الزوايا 42 u.
 مثل سائر الزوايا زاوية (1) ا ط د مساوية لزاوية ح د ز لكن زاوية ح د ز
 قائمة فزاوية د ط ا اذن قائمة فقد خرج من نقطة ط التي هي طرف
 قطر دائرة بـ ج خط ط ا على زاوية قائمة وقد تبين ببرهان به من
 ج ان الخط الخارج من طرف قطر الدائرة على زاوية قائمة يماس
 الدائرة فخط ا ط اذن مماس للدائرة فقد خرج من نقطة ا
 المفروضة الى دائرة بـ ج المفروضة خط ا ط يماس الدائرة وذلك ما
 اردنا ان نبين قال ايرن ان كانت النقطة المفروضة داخل الدائرة
 لم يمكن ان يخرج منها خط يماس الدائرة لان الخط يقطع الدائرة
 وان كانت على الخط المحيط اخرج قطر الدائرة من النقطة
 المفروضة ثم يُقام على تلك النقطة عمود فيكون ذلك العمود هو
 الخط المماس للدائرة . وان اردنا ان نُخرج خطين من نقطة ا
 الى محيط دائرة بـ ج يماسانها (2) فانا نخرج خط ح ز على الاستقامة
 الى نقطة ك ونصل بين نقطتي د ك بخط د ك يقطع الدائرة على
 نقطة ل ونصل خط ا ل فبين بحسب ما برهن الرياضي ان خط ا ل

aequalia erunt, singula singulis. Et angulus $AD\Theta$ duobus triangulis communis est; itaque ex I, 4 basis $A\Theta$ basi HZ aequalis est, et $\triangle AD\Theta = HDZ$, et omnes anguli omnibus angulis aequales; quare $\angle A\Theta D = HZD$. Sed angulus HZD rectus est; itaque angulus $D\Theta A$ rectus. Itaque a puncto Θ , quod terminus est diametri circuli BG , linea ΘA ad angulum rectum ducta est. Iam autem in III, 15 demonstratum est, lineam a termino diametri circuli ad rectum angulum ductam circumum contingere; itaque linea $A\Theta$ circumum contingit. Ergo a dato puncto A ad datum circumum BG linea $A\Theta$ ducta est circumum contingens. Q. n. e. d.

Hero dixit: Si punctum datum intra circumum est, fieri non potest, ut ab eo linea circumum contingens ducatur, quoniam linea circumum secat. Si punctum in ambitu est, diametrus circuli a puncto dato ducitur et deinde linea ad eam in hoc puncto perpendicularis; tum haec linea perpendicularis ea erit, quae circumum contingit.

Si a puncto A ad ambitum circuli BG duas lineas eum contingentes ducere uolumus, lineam HZ in directum ad punctum K producimus et duo puncta D, K linea DK coniungimus, quae circumum in puncto L secat. Linea AL ducta ex eo, quod geometra demonstravit, lineam AL ipsam quoque circumum contingere, manifestum est, quae linea lineae $A\Theta$ aequalis est. Iam igitur hoc quoque demonstratum est, si a puncto dato duae lineae circumum datum contingentes ductae sint, eas duas lineas inter se aequales esse. Q. n. e. d.



*) Repetitum.

*) In codice: ياسهانها

ايضا مماسٌ للدائرة وهو مساو لخط α فقد تبين ايضا ان كل نقطة مفروضة يخرج منها خطان يماسان دائرة مفروضة فان الخطين متساويان وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل السابع عشر من المقالة الثالثة

كل دائرة ماسها خطٌ مستقيم ويخرج من النقطة التي عليها المماس خط مستقيم الى مركز الدائرة فان الخط الخارج عموداً على الخط المماس فلننزل ان خط α يماس دائرة α على نقطة β ومركز الدائرة علامة ϵ فاقول ان خط $\beta\epsilon$ عموداً على خط α لا يمكن غيره فان امكن فلنخرج من نقطة ϵ التي هي المركز عموداً على خط α وليكن عمود $\epsilon\gamma$ فمن اجل ان زاوية $\epsilon\beta\gamma$ قائمة فان زاوية $(1) \epsilon\beta\gamma$ اصغر من قائمة لان كل زاويتين من زوايا المثلث اصغر من زاويتين قائمتين وذلك بين ببرهان يز من α ومن اجل ان الزاوية العظمى وترها الضلع الاطول بحسب ما بين ببرهان يط من α يكون ضلع $\beta\epsilon$ اعظم من ضلع $\epsilon\gamma$ ونقطة γ خارج الدائرة فخط $\epsilon\gamma$ اعظم من خط $\beta\epsilon$ فيكون خط $\beta\epsilon$ الاصغر اعظم من خط $\epsilon\gamma$ الاعظم هذا خلف فليس يمكن اذن ان يكون خط $\epsilon\gamma$ عموداً على خط α ولا غيره من الخطوط (2) سوى الخط الذي يصل بين موضع التماس وبين المركز مثل $\beta\epsilon$ وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل الثامن عشر من المقالة الثالثة

كل خط يماس دائرة ويخرج من حيث يماسها خط على زاوية [قائمة] يقطع الدائرة فان عليه يكون مركز الدائرة مثاله ان


Propositio XVII libri tertii.

Si linea recta circulum contingit, et a puncto contactus ad centrum circuli linea recta ducitur, linea ducta ad lineam contingentem perpendicularis erit.

Supponamus, lineam GD circulum AB in puncto B contingere, et centrum circuli esse punctum E . Dico, lineam BE ad lineam GD perpendicularem esse, neque aliter fieri posse.

Nam si fieri potest, a puncto E , quod centrum est, ad lineam GD perpendicularem EZ ducamus. Iam quoniam angulus EZB rectus est, angulus EBZ recto minor erit, quoniam ex I, 17 duo anguli trianguli duobus rectis minores sunt. Et quoniam ex I, 19 sub angulo maiore latus maius subtendit, latus BE latere EZ maius erit. Sed punctum Z extra circulum est; itaque $EZ > EB$, et linea EB minor linea EZ maiore maior. Quod absurdum est.

Ergo fieri non potest, ut aut linea EZ aut ulla alia linea praeter eam, quae punctum contactus et centrum coniungit, ut EB , ad lineam GD perpendicularis sit. Q. n. e. d.



Propositio XVIII libri tertii.

Si linea circulum contingit et a puncto contactus ad angulum [rectum] linea ducitur, quae circulum secat, in ea centrum circuli erit.

Exemplificatio. Linea GD circulum AB in puncto B contingit, et a puncto B ducta est linea BA ad lineam GD perpendicularis, quae circulum secat. Dico, centrum circuli esse in linea AB , neque aliter fieri posse. Nam, si fieri potest, supponamus, centrum esse punctum E . E, B coniungimus. Quoniam

¹⁾ Uerba quae sunt *زاوية فان* repetita. ²⁾ Repetitum.


خط جـ د يماس دائرة ا ب على نقطة ب وقد خرج من نقطة ب خط با عموداً على خط جـ د يقطع الدائرة فاقول ان مركز الدائرة على خط ا ب لا يمكن غيره فان امكن فلننزل ان المركز نقطة ه ونصل ه ب فين اجل ان خط جـ د يماس دائرة ا ب وقد خرج من النقطة التي عليها المماس خط مستقيم الى المركز وهو خط ب ه فان خط ب ه عمود على خط جـ د اودلك ببرهان ١٧ من ٣^{١)} فزاوية ه ب ج قائمة وقد كنا فرضنا زاوية ا ب ج قائمة فزاوية ا ب ج مساوية لزاوية ه ب ج الاعظم مساو للاصغر هذا خلف فليس يمكن ان تكون نقطة ه مركزاً لدائرة ا ب ولا غيرها من النقط التي ليست على 43 r. خط ا ب فمركز الدائرة اذن على خط ا ب وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل التاسع عشر من المقالة الثالثة

الزاوية التي على مركز كل دائرة ضعف الزاوية التي على المحيط اذا كانت قاعدتها قوساً واحدة مثاله ان دائرة ا ب ج على مركزها زاوية ب د ج وعلى محيطها زاوية ا ب ج وقاعدتهما قوس واحد وهي قوس ب ج فاقول ان زاوية ب د ج ضعف زاوية ا ب ج برهانه انا اخرج خط ا د ونخرجه الى علامة ه فين اجل ان مركز الدائرة نقطة ط وقد خرج منها خطا د ا ب فهما متساويان فبحسب برهان ه من ا تكون زاوية د ا ب مساوية لزاوية د ب ا ولان زاوية ب د ه خارج مثلث ا ب د ومجموع زاويتي د ا ب د ب ا ضعف زاوية د ا ب فانه بحسب برهان لب من ا تكون زاوية ب د ه مثل زاويتي د ا ب د ب ا فزاوية ب د ه مثل

^{١)} Hic primum numeri Arabici in textu adhibentur.

linea GD circulum AB contingit et a puncto contactus linea recta ad centrum ducta est, scilicet linea BE , ex III, 17 linea BE ad lineam GD perpendicularis erit, et $\angle EBG$ rectus. Iam autem supposuimus, angulum ABG rectum esse. Itaque angulus ABG angulo EBG aequalis erit, maior minori. Quod absurdum est. Itaque fieri non potest, ut aut punctum E aut aliud punctum, quod in linea AB non sit, centrum circuli AB sit. Ergo centrum circuli in linea AB est. Q. n. e. d.




Propositio XIX libri tertii.

In circulo angulus ad centrum positus duplo maior est angulo ad ambitum posito, si basis eorum idem arcus est.

Exemplificatio. Ad centrum circuli ABG angulus BDG positus est, et ad ambitum eius angulus BAG , et basis eorum idem arcus est, scilicet arcus BG . Dico, angulum BDG angulo BAG duplo maiorem esse.

Demonstratio. Lineam AD ad punctum E producimus. Quoniam centrum circuli est punctum D , duae lineae DA , DB ab eo ductae inter se aequales erunt, et ex I, 5 erit $\angle DAB = DBA$. Et quoniam angulus BDE extra triangulum ABD positus est, et summa duorum angulorum DAB , DBA angulo DAB duplo maior est, ex I, 32 angulus BDE duobus angulis DAB , DBA aequalis erit; quare angulus BDE duplo maior est angulo BAD . Et eadem ratione demonstrabitur, angulum GDE angulo GAD duplo maiorem esse. Totus igitur angulus BDG




ضعف زاوية $\overline{ب\alpha د}$ وبمثل هذا الاستشهاد يتبين ان زاوية $\overline{جده}$ ضعف زاوية $\overline{ب\alpha د}$ وبمثل هذا الاستشهاد يتبين ان زاوية $\overline{جده}$ مثل ضعف زاوية $\overline{ج\alpha د}$ فجميع زاوية $\overline{ب\alpha د}$ ضعف جميع زاوية $\overline{ب\alpha ج}$ فقد ظهر ان الزاوية التي على مركز كل دائرة ضعف الزاوية التي على محيطها اذا كانت قاعدتها قوساً واحدة وذلك ما اردنا ان نبين .: قال ايرن فان كان وضع الزاوية التي على المحيط مثل [وضع] زاوية $\overline{ج\alpha ب}$ وخط $\alpha د$ يتصل بخط $\overline{د\beta}$ على استقامة فظاهر ان زاوية $\overline{ج\alpha د}$ ضعف زاوية $\overline{ج\alpha ب}$.: وان كان وضع الزاوية التي على المحيط مثل وضع زاوية $\overline{ج\alpha د}$ على ان تقاطع خط $\overline{ج\alpha د}$ خط $\overline{د\beta}$ فانما نخرج خط $\overline{د\gamma}$ فمن اجل ان خط $\overline{د\gamma}$ مساو لخط $\overline{د\beta}$ فان زاوية $\overline{د\alpha ب}$ مساوية لزاوية $\overline{د\alpha د}$ فزاوية $\overline{ب\alpha د}$ هي خارج مثلث $\overline{د\alpha ب}$ ضعف زاوية $\overline{د\alpha ب}$ وايضا فان خط $\overline{د\gamma}$ مساو لخط $\overline{د\beta}$ فزاوية $\overline{د\alpha د}$ مساوية لزاوية $\overline{د\alpha ج}$ فزاوية $\overline{ز\alpha د}$ ضعف زاوية $\overline{د\alpha ج}$ فاذا اسقطناها بقيت زاوية $\overline{ب\alpha د}$ ضعف زاوية $\overline{ب\alpha ج}$ وذلك ما اردنا ان نبين .:

وقال ايرن ايضاً اما الشكل فقد تبين بكل وضع وبرهن على كل عمل وقد يبقى علينا ان نضع المقدمة المقلولة له وبرهنه برهاناً عاماً لانه ان لم يبرهن على ما سنبرهنه لم يمكننا ان نبرهن الشكل الذي بعده على كل وضع لكن على ما وضعه الرياضي فقط وذلك منكراً لانه قد يجب اضطراراً ان تُصير المقدمة عامة وان يُبرهن على كل وضع وان نُحلل عنايد المعاندين ليلا يكون شيء في المساحة غير مُبرهن واذا وضعنا هذه المقدمة وبيّنا الشكل كان جميع ما في الشكل بيّناً واضحاً ولا يبقى للمعاندين موضع

toto angulo BAG duplo maior erit. Ergo manifestum est, angulum ad centrum circuli positum angulo ad ambitum eius posito duplo maiorem esse, si basis eorum idem arcus sit. Q. n. e. d.

Hero dixit: Si positio anguli ad ambitum positi ea est, quam angulus GAB obtinet, linea AD cum linea DB in directum coniuncta, manifestum est, angulum GDB angulo GAB duplo maiorem esse.

Sin positio anguli ad ambitum positi ea est, quam obtinet angulus GDB , linea GD lineam EB secante, lineam DEZ ducimus. Quoniam igitur $ED = EB$, erit $\angle EDB = EBD$. Itaque angulus BEZ , qui extra triangulum EBD positus est, angulo EDB duplo maior erit. Rursus $ED = EG$; quare $\angle EDG = EGD$. Itaque angulus ZEG angulo EDG duplo maior erit. Quibus duobus subtractis relinquitur angulus BEG duplo maior angulo BDG . Q. n. e. d.



Rursus Hero dixit: Iam igitur haec propositio in omni positione demonstrata est, et demonstratio ad omnem constructionem adaptata est. Uerum tamen restat, ut propositionem praeuiam huc pertinentem exponamus et demonstratione ad omnes casus adcommodata ostendamus; nisi enim hoc ea ratione demonstratum erit, qua nos usuri sumus, fieri non potest, ut propositionem sequentem in omni¹⁾ positione demonstramus, sed in ea sola, quam geometra supposuit. Quod uituperandum²⁾ est, quia necesse est, demonstrationem uniuersalem proponi et rem in omni positione ostendi, cauillationesque aduersariorum

¹⁾ Gher. Crem. (ed. Curtze p. 131): »secundum ceh (!) positionem«. »ceh« igitur »omnem« significat.

²⁾ Gher. Crem. (l. 1.): »possibile«. Aperte pro ممکن legit منکر.

عناد فيه اعنى في الشكل الذى بعد هذا وهو الشكل العشرون
 والمقدمة التى يجب تقديمها والشكل الموضوع لها هو هذا الزاوية
 التى على مركز كل دائرة هى ضعف الزاوية التى على محيطها اذا
 كانت قاعدتُهما جميعاً قوساً واحدةً والزوايا الباقية التى على المركز
 وهى تثبتُ الاربع القوائم ضعف الزاوية التى على المحيط فى القوس
 التى تؤثر الزاوية التى على المركز فلتكن الزاوية التى على المركز
 زاوية جـهـبـ والتى على المحيط زاوية جـابـ ونُخرج خطى بـهـ جـهـ على
 استقامتهما الى محيط الدائرة الى نقطتى حـز ونُخرج خطى جـط طـب
 وخط طـه فاقول ان كل الزوايا التى تقع فى قوس بـاـجـ حيث كان
 43 u. وقوعُها وقاعدة جميعها قوس بـطـجـ فان زاوية جـهـبـ ضعف لكل
 واحدة منها وان مجموع زوايا بـهـز زـهـحـ حـهـجـ ضعف زاوية بـطـجـ
 وضعف لكل واحدة من الزوايا التى تقع فى قوس بـطـجـ¹⁾ .
 برهانه ان نقطة هـ مركز الدائرة فخط هـبـ مثل خط هـط فزاوية هـبـطـ
 مساوية لزاوية هـطـبـ فزاوية حـهـطـ اذن الخارجة ضعف زاوية هـطـبـ
 وايضا خط هـطـ مثل خط هـجـ فزاوية هـطـجـ مثل زاوية هـجـطـ فزاوية
 زـهـطـ ضعف زاوية هـطـجـ فمجموع زاويتي حـهـطـ زـهـطـ ضعف زاوية بـطـجـ
 لكن زاوية جـهـبـ مساوية لزاوية حـهـز وذلك يبين²⁾ ببرهان يهـ من افاذا
 اسقطنا زاوية جـهـبـ واخذنا بدلها زاوية حـهـز بقيت زاويتا حـهـجـ زـهـبـ
 مع زاوية حـهـز ضعف زاوية جـطـبـ وظاهر ان زاوية بـطـجـ حيث
 فرضناها من قوس بـطـجـ فان زوايا جـهـحـ حـهـز زـهـبـ الثلث اذا

¹⁾ In margine: يعنى المركبة على القوس Significat angulos, qui super arcu constructi sunt.

²⁾ In margine additum.

dissolui, ne quidquam sit in geometria, quod demonstratum non sit. Exposita uero hac propositione praeuia et demonstrata figura omnia, quae propositio continet, manifesta et certa sunt, nec aduersariis locus relinquitur cauillandi in propositione sequenti, quae est XX.

Praeuia igitur propositio, qua opus est, et figura ad eam pertinens haec est:

Angulus ad centrum circuli positus angulo ad ambitum eius posito duplo maior est, si basis eorum communis idem arcus est, et reliqui anguli ad centrum positi, qui quattuor rectos complent, duplo maiores sunt angulo ad ambitum posito in arcu, qui angulo ad centrum posito oppositus est.

Angulus ad centrum positus sit angulus GEB et angulus ad ambitum positus angulus GAB . Duabus lineis BE , GE in directum ad ambitum circuli ad duo puncta H , Z productis duas lineas $G\Theta$, ΘB et lineam $\Theta E^1)$ ducimus.

Dico, omnibus angulis, qui quoquo modo in arcu BAG cadant, et quorum basis communis sit arcus $B\Theta G$, singulis duplo maiorem esse angulum GEB , et summam angulorum BEZ , ZEH , HEG duplo maiorem esse angulo $B\Theta G$ et omni angulo, qui in arcu $B\Theta G$ cadat, duplo maiorem.

Demonstratio. Punctum E centrum circuli est; itaque $EB = E\Theta$; quare $\angle EB\Theta = \angle E\Theta B$. Angulus igitur $HE\Theta$ extrinsecus positus duplo maior est angulo $E\Theta B$. Rursus $E\Theta = EG$ et $\angle E\Theta G = \angle EG\Theta$; itaque angulus ZEO angulo EOG duplo maior erit. Summa igitur duorum angulorum $HE\Theta$, ZEO angulo $B\Theta G$ duplo maior erit. Sed ex I, 15 erit $\angle GEB = \angle HEZ$. ²⁾ Iam si angulum GEB subtrahimus, et pro eo angulum HEZ ei aequalem adsumimus ²⁾, relinquuntur duo anguli HEG , ZEB cum angulo HEZ angulo $G\Theta B$ duplo maiores. Et manifestum est, sumpto


¹⁾ Gher. Crem. uerba quae sunt: »et lineam ΘE « omisit.
²⁻²⁾ Haec uerba Gher. Crem. omisit.

جُمعت مساوية لضعف زاوية $\overline{ب\Gamma\Delta}$ [ج ف] كل الزوايا التي تقع اذن في قطعة قوس $\overline{ب\Gamma\Delta}$ متساوية وايضا فمن اجل ان زاوية $\overline{ب\Delta\Gamma}$ عملت كيف وقعت وقد تبين ان الزاوية التي على المركز ضعفها وهي زاوية $\overline{ب\Delta\Gamma}$ فان كل الزوايا التي في القطعة الواحدة اعني المرسومة في قوس $\overline{ب\Delta\Gamma}$ متساوية لانه قد تبين ان زاوية $\overline{ب\Delta\Gamma}$ ضعف كل واحدة منها وايضا فمن اجل ان زاوية $\overline{ب\Gamma\Delta}$ في قطعة $\overline{ب\Gamma\Delta}$ وقد ظهر ان زوايا $\overline{ب\Delta\Gamma}$ $\overline{ز\Delta\Gamma}$ $\overline{ح\Delta\Gamma}$ اذا جُمعت ضعفها فان الزوايا كلها التي تُرسم في قطعة $\overline{ب\Gamma\Delta}$ متساوية لان كل واحدة منها نصف الزوايا المذكورة اذا جُمعت فقد تبين ان كل الزوايا التي تقع في قطعة واحدة متساوية وهذا الذي كنا اردنا ان نبينه كليا ولذلك جعلنا هذا الشكل ليتبين ما قاله الرياضي بيانا كليا واذا قد تبين هذا فان الشكل الذي بعده يتبرهن معه وذلك بان نقول من اجل ان زوايا $\overline{ب\Delta\Gamma}$ $\overline{ز\Delta\Gamma}$ $\overline{ح\Delta\Gamma}$ اذا جُمعت مساوية لضعف زاوية $\overline{ب\Gamma\Delta}$ وزاوية $\overline{ب\Delta\Gamma}$ ضعف زاوية $\overline{ب\Delta\Gamma}$ فمجموع الاربعة الزوايا اعني زوايا $\overline{ب\Delta\Gamma}$ $\overline{ز\Delta\Gamma}$ $\overline{ح\Delta\Gamma}$ $\overline{ب\Gamma\Delta}$ لضعف زاويتي $\overline{ب\Gamma\Delta}$ $\overline{ب\Delta\Gamma}$ لكن الاربعة الزوايا مُعادلات لاربعة زوايا قائمة وذلك بين ببرهان يه من ا فمجموع زاويتي $\overline{ب\Gamma\Delta}$ $\overline{ب\Delta\Gamma}$ اذن مثل مجموع زاويتي قائمتين فاذن السطوح ذوات الاربعة الاضلاع التي في كل دائرة فان كل زاويتين تتقابلان مساويتان لزاويتي قائمتين . قال النيريزي هذا البرهان والذي قبله ثلثة اشكال الشكل التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون .

angulo $B\theta G$ arcus $B\theta G$ tres angulos GEH , HEZ , ZEB coniunctos duplo maiores esse angulo $B\theta G$. Ergo omnes anguli, qui in segmento arcus $B\theta G$ cadunt, inter se aequales sunt.

Rursus quoniam angulus BAG quolibet modo constructus est, et iam demonstratum est, angulum ad centrum positum, scilicet angulum BEG , duplo maiorem eo esse, omnes anguli in eodem segmento positi, eo scilicet, quod in arcu BG descriptum est, inter se aequales sunt, quoniam demonstratum est, angulum BEG quouis eorum duplo maiorem esse.

Praeterea, quoniam angulus $B\theta G$ in segmento $B\theta G$ positus est, et manifestum est, angulos BEZ , ZEH , HEG coniunctos duplo maiores eo esse, omnes anguli in segmento $B\theta G$ descripti inter se aequales sunt, quia singuli dimidia sunt angulorum coniunctorum, quos nominauimus. Ergo demonstratum est, omnes angulos in eodem segmento positos inter se



aequales esse. Et hoc est, quod uoluimus, demonstrationem eius rei uniuersalem esse; quare hanc propositionem exposuimus, ut demonstratione uniuersali ostenderetur, quod dixit geometra. Quo demonstrato propositio sequens simul demonstrata est, si ita ratiocinamur: Quoniam anguli BEZ , ZEH , HEG coniuncti angulo $B\theta G$ duplo maiores sunt, et angulus BEG angulo BAG duplo maior est, summa quattuor angulorum BEG , BEZ , ZEH , HEG duobus angulis $B\theta G$, BAG duplo maior est. Sed quattuor illi anguli ex I, 15 quattuor rectis aequales sunt; itaque summa duorum angulorum $B\theta G$, BAG summae duorum rectorum aequalis est. Ergo quadrilaterorum in circulo positorum duo anguli oppositi duobus rectis aequales sunt.

Al-Narizi dixit: Haec demonstratio cum praecedenti trium propositionum demonstrationes continet, XIX, XX, XXI.

الشكل العشرون من المقالة الثالثة

الزوايا التي في قطعة واحدة من دائرة فهي متساوية اذا كان يوترها قوس واحدة مثالة ان دائرة $\overline{ا ب ج د}$ في قطعة منها وهي قطعة $\overline{ج ا ب د}$ زاويتي $\overline{ج ا د}$ $\overline{ج ب د}$ على قاعدة واحدة وهي قوس $\overline{ج د}$ فاقول انها متساويتان برهانه انا نستخرج مركز الدائرة وليكن نقطة $هـ$ ونُخرج خطي $هـ ج$ $هـ د$ فبحسب برهان يط من $ج$ فان زاوية $\overline{ج هـ د}$ ضعف لكل واحدة من زاويتي $\overline{ج ا د}$ $\overline{ج ب د}$ والاشياء التي هي نصف لشي واحد فان الاشياء متساوية فزاوية $\overline{ج ا د}$ اذن مساوية لزاوية $\overline{ج ب د}$ وذلك ما اردنا ان نبين .
قال ايرن وقد يمكن ان نبرهن هذا الشكل برهانا عامّا بالشكل الذي قدّمناه

44 r.

الشكل الواحد والعشرون من المقالة الثالثة


كل دائرة يقع فيها سطح ذو اربعة اضلاع فكل زاويتين تتقابلان منه فهما مساويتان لزاويتين قائمتين مثاله ان في دائرة $\overline{ا ب ج د}$ سطح $\overline{ا ب ج د}$ فاقول ان كل زاويتين تتقابلان منه فهما مساويتان لزاويتين قائمتين برهانه انا نُخرج خطي $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ فين اجل ان زاويتي $\overline{ب ا ج}$ $\overline{ب د ج}$ في قطعة واحدة وهي قطعة $\overline{ب ا د ج}$ وعلى قوس واحدة وهي قوس $\overline{ب ج}$ فببرهان ك من $ج$ تكون زاوية $\overline{ب ا ج}$ مساوية لزاوية $\overline{ب د ج}$ وايضاً فان زاويتي $\overline{ا ب ج}$ $\overline{ا د ج}$ في قطعة واحدة

Propositio XX libri tertii.

Anguli in eodem segmento circuli positi inter se aequales sunt, si idem arcus iis oppositus est.

Exemplificatio. In segmento $GABD$ circuli $ABGD$ duo anguli GAD , GBD in eadem basi, scilicet arcu GD , positi sunt. Dico, eos inter se aequales esse.

Demonstratio. Centrum circuli sumimus, quod sit punctum E , et duas lineas EG , ED ducimus. Ex III, 19 igitur angulus GED duplo maior est utrovis duorum angulorum GAD , GBD . Quae autem eiusdem rei dimidia sunt, inter se aequalia sunt. Ergo $\angle GAD = GBD$. Q. n. e. d.



Hero dixit¹⁾: Haec propositio demonstrari potest demonstratione propositionem, quae praecedat, amplectenti.

Propositio XXI libri tertii.

In spatio quattuor laterum in circulo posito duo anguli eius oppositi duobus rectis aequales sunt.

Exemplificatio. In circulo $ABGD$ comprehenditur spatium $ABGD$. Dico, duos angulos eius oppositos duobus rectis aequales esse.

Demonstratio. Duas lineas AG , DB ducimus. Quoniam duo anguli BAG , BDG in eodem segmento $BADG$ et in eodem arcu BG positi sunt, ex III, 20 erit $\angle BAG = BDG$. Rursus, quoniam duo anguli ADB , AGB in eodem segmento et in eodem

¹⁾ Apud Gher. Crem. in editione Maximiliani Curtze haec nota Heronis deest; est autem in cod. Regin. 1268, ubi A. A. Bjørnbo haec legit:

«De figura 20a dixit Irinus: hec figura est secundum quod posuit et probatur cum figura quae eam procedit.»


وعلى قوس واحدة فزاويتنا $\overline{أ ب}$ $\overline{أ ج}$ متساويتان ^{١)} فمجموع زاويتي $\overline{ب أ ج}$ $\overline{أ ب ج}$ مثل زاوية $\overline{أ د ج}$ وناخذ زاوية $\overline{أ ب ج}$ مشتركة فزاويا $\overline{ب أ ج}$ $\overline{ب ج أ}$ مساوية لزاويتي $\overline{أ ب ج}$ $\overline{أ د ج}$ وبحسب برهان لب من ١ تكون زاويا $\overline{ب أ ج}$ $\overline{أ ب ج}$ مساوية لزاويتين قائمتين فزاويتنا $\overline{أ د ج}$ $\overline{أ ب ج}$ المتقابلتان اذن مساويتان لزاويتين قائمتين وعلى هذا المثال يتبين ان مجموع زاويتي $\overline{ب أ د}$ $\overline{ب ج د}$ مساو لزاويتين قائمتين فكل سطح ذو اربعة اضلاع يقع في دائرة فان كل زاويتين من زاويا متقابلتين تساويان لزاويتين قائمتين وذلك ما اردنا ان نبين قال ايرن وهذا الشكل يتبرهن ايضا بالشكل الذي قد مناه .

الشكل الثاني والعشرون من المقالة الثالثة

لا يمكن ان يقوم على خط واحد مستقيم قطعتان متشابهتان من دائرتين احد هما اعظم من الاخرى فان امكن ان تقوم فلننزل انهما قطعتا $\overline{أ ب}$ $\overline{أ د}$ والعظمى منهما قطعة $\overline{أ ب}$ ونخرج خط $\overline{أ ج}$ وننفذه على الاستقامة الى نقطة $\overline{د}$ ونخرج خطي $\overline{ب د}$ $\overline{أ د}$ فمن اجل ان قطعة $\overline{أ ب}$ تشبه قطعة $\overline{أ د}$ فان زاوية $\overline{أ ب ج}$ مساوية لزاوية $\overline{أ د ج}$ لان القسي المتشابهة تقبل زوايا متساوية ولان زاوية $\overline{أ ب ج}$ خارج مثلث $\overline{ج ب د}$ بحسب برهان ١٩ من ١ تكون زاوية $\overline{أ ب ج}$ اعظم من زاوية $\overline{أ د ج}$ فزاوية $\overline{أ ب ج}$ مساوية لزاوية $\overline{أ د ج}$ وهي ايضا اعظم منها هذا خلف غير ممكن فليس يقوم اذن على خط واحد

^{١)} In cod.: مساويتان

arcu positi sunt, anguli ADB , AGB inter se aequales sunt. Itaque summa duorum angulorum BAG , AGB angulo ADG aequalis est. Angulo igitur ABG communi sumpto anguli BAG , BGA , ABG duobus angulis ABG , ADG aequales sunt. Uerum ex I, 32 anguli BAG , AGB , ABG duobus rectis aequales erunt; itaque duo anguli ADG , ABG oppositi duobus rectis aequales erunt. Eodem modo demonstramus, summam duorum angulorum BAD , BGD duobus rectis aequalem esse. Ergo in spatio quatuor laterum in circulo posito duo anguli eius oppositi duobus rectis aequales sunt. Q. n. e. d.




Hero dixit¹⁾: Haec quoque propositio per propositionem praecedentem demonstratur.

Propositio XXII libri tertii.

Fieri non potest, ut in eadem linea recta duo segmenta duorum circulorum inter se similia posita sint, quorum alterum altero maius sit.

Nam si fieri potest, ut ita posita sint, supponamus, ea esse segmenta AGB , ADB , quorum segmentum ADB maius sit. Linea AG ducta et in directum ad punctum D producta duas lineas BG , BD ducimus. Iam quoniam segmentum AGB segmento ADB simile est, angulus AGB angulo ADB aequalis erit, quoniam arcus inter se similes angulis inter se aequalibus oppositi sunt. Et quoniam angulus AGB extra triangulum GBD positus est, ex I, 16 erit $\angle AGB > \angle ADB$. Erat autem angulus AGB angulo ADB aequalis; et rursus eo



¹⁾ Apud Gher. Crem. haec nota deest.

قطعتان متشابهتان^{١)} من دائرتين احدهما اعظم من الاخرى وذلك ما اردنا ان نبين^{٢)} .

الشكل الثالث والعشرون من المقالة الثالثة

تَطْعُ الدوائر المتشابهة اذا كانت على خطوط مستقيمة متساوية فانها متساوية^{٣)} مثاله ان قطعتي ا ب ج د هـ متشابهتان وهما على خطي ا ج د هـ المتساويين فاقول ان القطعتين متساويتان برهانه انا اذا ركبنا قطعة ا ب ج على قطعة د هـ نركب خط ا ج على خط د هـ ولم يفضل احدهما على الاخر لانهما متساويان وتركبت قطعة ا ب ج على قطعة د هـ ولم تفضل ايضا احدهما على الاخرى لانهما متشابهتان فان فضلت وقعت قوس ا ب ج خارج قوس د هـ او داخلها فلننزل انها وقعت اولا خارجا كقوس د ح ز فقطعة د ح ز تشبه قطعة د هـ وقد تبين ببرهان ك ب من ج انه لا يمكن ان يقوم على خط واحد مستقيم قطعتان متشابهتان من دائرتين احدهما اعظم من الاخرى فقطعة د ح ز اعظم من قطعة د هـ وهي شبيهة بها هذا

قال الشيخ حد القطعتين المتشابهتين ان^{٤)} تكون الزوايا المركبة عليهما متساوية وان شئت قلت هي التي نسبتها الى دوائرها نسبة واحدة وليس المتشابهة كالمساوي منهما فرق كما ذكرناه .

Uir doctissimus dixit: Definitio segmentorum similium ea est, ut anguli in iis positi inter se aequales sint; et, si placet, ea dici possunt, quorum ad circulos suos ratio eadem sit. Sed similia ea esse aliud est atque aequalia ea esse; interest enim, sicut commemorauimus.

maior est. Quod absurdum est neque fieri potest. Ergo in eadem linea [recta] duo segmenta duorum circulorum inter se similia¹⁾ posita non sunt, quorum alterum altero maius est. Q. n. e. d.²⁾

Propositio XXIII libri tertii.

Segmenta circulorum inter se similia, si in rectis lineis inter se aequalibus posita sunt, inter se aequalia sunt.

Exemplificatio. Duo segmenta ABG , DEZ inter se similia in duabus lineis [rectis] AG , DZ inter se aequalibus posita sunt. Dico, duo segmenta inter se aequalia esse.

Demonstratio. Segmento ABG ad segmentum DEZ applicato lineam AG ad lineam DZ applicamus; neque altera alteram excedet, quoniam inter se aequales sunt. Et segmentum ABG cum segmento DEZ concidet, nec alterum alterum excedet, quoniam inter se similia sunt. Nam si excedet, arcus ABG aut extra arcum DEZ cadet aut intra eum. Prius supponamus, eum cadere extra arcum ut DHZ , ita ut segmentum DHZ segmento DEZ simile sit. Iam in III, 22 demonstratum est, fieri non posse, ut in eadem linea recta duo segmenta duorum circu-

¹⁾ In margine est: قال النريزي فان قال قائل انه يقوم في جهتين مختلفتين فان كانت قطعة ادب الاعظم في الجهة الاخرى من خط اب فانا متى اقمنا على خط اب في جهة قطعة اجب قطعة مساوية لقطعة ادب فضلت على قطعة اجب وصار وضعها هذا الوضع الذي هي عليه فيعود البرهان الى الذي برهنه الرياضي.

Al-Narizi dixit: Si quis dixerit, ex duabus partibus diuersis ea posita esse posse, segmentum ADB maius ex altera parte lineae AB positum sit. Iam si in linea AB ex parte segmenti ABG segmentum segmento ADB aequale erigimus, segmentum AGB excedet, et positio eius eadem erit, quae in figura. Quare demonstratio ad id reuertetur, quod geometra demonstrauit.*)

²⁾ Ex hac nota sequitur, Arabem uerba *ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέγεθος* p. 224, 8 non habuisse (om. V m. 1)


خلف غير ممكن فقطعة $\overline{أب}$ اذن مساوية لقطعة $\overline{دز}$ وكذلك
يتبين لو وقعت قوس $\overline{دحز}$ داخل قوس $\overline{دز}$ فالقطوع المتشابهة اذا
كانت على خطوط مستقيمة متساوية فان القطوع متساوية وذلك
ما اردنا ان نبين .:

44 u.

الشكل الرابع والعشرون من المقالة الثالثة

اذا كانت قطعة من دائرة معلومة فاردنا ان نبين كيف
نتم الدائرة التي القطعة منها نصف دائرة كانت او اعظم او اصغر
فانا ننزل أولا ان القطعة المفروضة التي عليها $\overline{أب}$ نصف دائرة
ونبين كيف نتم دائرتها فلتكن القطعة على ما في الصورة الاولى
فمن اجل ان قطعة $\overline{أب}$ نصف دائرة فان خط $\overline{جدب}$ قطر الدائرة
التي قطعة $\overline{أب}$ نصفها فمِنْ الظاهر ان مركز الدائرة على مُنصف
خط $\overline{أب}$ اذا كانت الخطوط التي تخرج من المركز الى المحيط متساوية
فنقسم خط $\overline{ج ب}$ بنصفين على نقطة $\overline{د}$ كما بين ببرهان $\mathbf{د}$ من $\mathbf{ا}$
فعلى مركز $\overline{د}$ وبعيد $\overline{د ج}$ ونتم دائرة $\overline{أ ب ج}$. ثم ننزل ان القطعة
التي عليها $\overline{أ ب ج}$ من الصورة الثانية اعظم من نصف دائرة ونبين
كيف نتم دائرتها فنقسم خط $\overline{أ ب ج}$ بنصفين كما بين ببرهان
 $\mathbf{د}$ من $\mathbf{ا}$ على نقطة $\overline{د}$ ونخرج من نقطة $\overline{د}$ خط $\overline{د أ}$ عمودا على خط
 $\overline{أ ب ج}$ كما بين ببرهان $\mathbf{د}$ من $\mathbf{ا}$ فمِنْ اجل ان قطعة $\overline{أ ب ج}$ اعظم من
نصف دائرة فان مركز الدائرة اذن يقع فيها ومِنْ اجل ان خط
 $\overline{أ ب ج}$ في دائرة $\overline{أ ب ج}$ وقد قسم على نقطة $\overline{د}$ بنصفين واخرج عمود

lorum inter se similia posita sint, quorum alterum altero maius sit. Uerum segmentum DHZ segmento DEZ maius est, quod ei



simile est. Quod absurdum est neque fieri potest. Itaque segmentum ABG segmento DEZ aequale est. Eodem modo demonstratio fit, si arcus DHZ intra arcum DEZ cadit.

Ergo segmenta inter se similia, si in rectis lineis inter se aequalibus posita sunt, inter se aequalia sunt. Q. n. e. d.

Propositio XXIV libri tertii.

Segmento circuli dato demonstrare uolumus, quo modo circum suppleamus, cuius segmentum sit, siue semicirculus est siue maius siue minus.

Primum supponimus, segmentum datum ABG semicirculum esse, et demonstrare uolumus, quo modo circum eius suppleamus.

Segmentum ita sit ut in figura prima.

Quoniam segmentum BAG semicirculus est, linea GDB diametrus est circuli, cuius dimidia pars est segmentum BAG . Manifestum est, centrum circuli esse in media linea BG , quia lineae a centro ad ambitum ductae inter se aequales sunt.

Itaque linea GB ex I, 10 in puncto D in duas partes aequales diuisa centro D et radio DG uel DB circum ABG supplemus.

Deinde supponimus, segmentum BAG , ut est in figura secunda, semicirculo maius esse, et demonstrare uolumus, quo modo circum eius suppleamus.

Linea BG ex I, 10 in puncto D in duas partes aequales

دَا فظاهر بحسب برهان ٣ من ٣ ان مركز الدائرة على خط دَا^{١)}
 فلان خط دَا يمر بالمركز فهو اطول المخطوط كُلِّها التي تخرج من
 نقطة دَا الى محيط قطعة بَا ج وذلك بين ببرهان ز من ج نخط دَا
 اعظم من خط دَبْ ونُخرج خط بَا فبحسب برهان يح من ا فان
 زاوية ا ب د اعظم من زاوية ب ا د فنعمل على^{٢)} نقطة ب من خط ا ب
 زاويةً مثل زاوية ب ا د كما بين عمله ببرهان كج من ا ولتكن زاوية
 ا ب ه ونخرج خطي ب ه ج ه فين اجل ان زاوية ب ا ه مساوية لزاوية
 ا ب ه فان بحسب برهان و من ا يكون ضلع ا ه مساويا لضلع ب ه
 ومن اجل ان زاوية ب د ه مساوية لزاوية ج د ه و خط ب د مثل خط
 ج د فاذا اخذنا د ه مشتركًا يكون خطا ب د د ه مساويين لخطي
 ج د د ه والزاويتان اللتان عند د متساويتان فبحسب برهان د من
 ا يكون خط ب ه مساويا لخط ج ه وقد بينا ان نخط ا ه مثل خط ه ب
 فنقطة ه في قطعة دائرة بَا ج وقد خرج منها اكثر من خطين
 وصارت متساويةً فبحسب برهان ط من ج تكون نقطة ه مركزًا
 لدائرة بَا ج فعلى نقطة ه وبُعيد ه ا نتم الدائرة . ثم نزل ان
 القطعة على ما في الصورة الثالثة اصغر من نصف دائرة وهي قطعة
 بَا ج ونقسم خط بَا ج بنصفين على نقطة د ونقيم على نقطة د
 عمود دَا وننفذه الى قوس بَا ج فمن اجل ان خط بَا ج وتر لقوس
 بَا ج وقد قُسم بنصفين على نقطة د واُخرج عمود دَا فظاهر
 ببرهان ج من ج ان خط ا د تمام القطر وبحسب برهان ز من

^{١)} In margine clarius scriptum.

^{٢)} In margine additum.

diuisa a puncto D ex I, 11 lineam DA ad lineam BG perpendicularem ducimus. Quoniam igitur segmentum BAG semicirculo maius est, centrum circuli in eo cadet. Et quoniam linea BG in circulo BAG posita in puncto D in duas partes aequales diuisa est, et DA perpendicularis ducta est, ex III, 3 manifestum est, centrum circuli in linea DA esse. Quoniam igitur linea DA in centrum cadit, ex III, 7 maxima est omnium linearum, quae a puncto D ad ambitum segmenti BAG ducuntur. Itaque linea DA linea DB maior erit. Quare ducta linea BA ex I, 18 angulus ABD angulo BAD maior erit. Ad punctum B lineae AB ex I, 23 angulum ABE angulo BAD aequalem construimus et duas lineas BE , GE ducimus. Quoniam igitur $\angle BAE = ABE$, ex I, 6 latus AE lateri BE aequale erit. Et quoniam $\angle BDE = GDE$ et $BD = DG$, [linea] DE communi sumpta duae lineae BD , DE duabus lineis GD , DE aequales erunt. Et duo anguli ad D positi inter se aequales sunt; itaque ex I, 4 linea BE lineae GE aequalis erit. Sed iam demonstrauius, [lineam] AE lineae EB aequalem ductam esse; itaque in segmento circuli BAG positum est punctum E , a quo plures quam duae lineae ita ductae sunt, ut inter se aequales fiant. Itaque ex III, 9 punctum E centrum est circuli BAG , et a puncto E radio EA circulum supplemus.

Deinde segmentum circuli supponimus, sicut est in figura tertia, scilicet segmentum BAG semicirculo minus esse. Linea BG in puncto D in duas partes aequales diuisa in puncto D perpendicularis DA erigitur, quam ad arcum BAG producimus. Quoniam linea BG chorda est arcus BAG et in puncto D in duas partes aequales diuisa est, et DA perpendicularis ducta est, ex III, 3 manifestum est, lineam AD esse supplementum diametri, et ex III, 7 linea DA linea DB minor est. Lineam AB ducimus. Ex I, 18 igitur angulus BAD angulo ABD maior est. Iam ad punctum B lineae AB angulum angulo BAD aequalem construimus, sitque angulus ABE . Lineam AD producimus, ita ut cum linea BE in puncto E econurrat, et lineam EG ducimus.

ج فان خط دا اصغر من خط دب فنخرج خط اب فحسب برهان
يح من ا فان زاوية باد اعظم من زاوية ابد فنعمل على نقطة ب
من خط اب زاوية مساوية لزاوية باد ولتكن زاوية ابة ونخرج
خط اد يلقي خط بة على نقطة ه ونخرج خط هـ فلان زاوية ا
مساوية لزاوية ب فان خط هـ مساو لخط هـ وبمثل ما بينا نبين
ان خط هـ مساو لخط هـ فالخطوط الثلاثة متساوية هـ (هـ) هـ ا فعلى
نقطة هـ وببعد هـ نتم الدائرة وذلك ما اردنا ان نبين .: هذا الشكل
اخره ايرن وجعله الشكل الواحد والثلاثين لانه قصد للبرهان
عليه في صورة واحدة¹⁾.

45 r.


الشكل الخامس والعشرون من المقالة الثالثة

الزوايا المتساوية التي في الدوائر المتساوية فانها على قسي
متساوية على المحيطات كانت او على المراكز مثاله ان دائرتي ابج
دهـ متساويتان ومركزاهما نقطتا حـطـ وعليهما زاويتا بـحـ جـ هـ طـز
فاقول ان قوس بـجـ مساوية لقوس هـز برهانه انا نفرض على قوسي
بـاـجـ هـدـز نقطتين كيف ما وقعتا فننزل انهما نقطتا اـ دـ ونخرج
خطوط ابـ اجـ دهـ دز بـجـ هـز فمن اجل ان خطي بـحـ حـ جـ مثل

¹⁾ In margine atramento rubro: لان بـد مثل دـجـ ودهـ مشترك
فضلعا بـدـ دهـ مثل ضلعي دـدـ دهـ وزاوية بـدهـ مثل زاوية جـدهـ
فقاعدة هـبـ مثل قاعدة جـهـ عـ

Quoniam $BD = DG$ et DE communis, duo latera BD , DE duobus lateribus GD , DE aequalia erunt, et $\angle BDE = GDE$. Itaque basis EB basi GE aequalis erit.

Quoniam igitur $\angle A$ $\angle B$ aequalis est, linea EA lineae EB aequalis erit. Et eadem demonstratione qua antea demonstrabimus, lineam EG lineae EB aequalem esse. Itaque tres lineae EG , EB , EA inter se aequales sunt. Ergo ex puncto E radio EA circulum supplemus. Q. n. e. d.



Hanc propositionem postposuit Hero eamque propositionem XXXI fecit,¹⁾ quia ei propositum erat eam una figura demonstrare.¹⁾

Propositio XXV libri tertii.

Anguli inter se aequales in circulis inter se aequalibus in arcubus inter se aequalibus positi sunt, siue ad ambitus siue ad centra positi sunt.

Exemplificatio. Duo circuli ABG , DEZ inter se aequales sunt, et centra eorum sunt duo puncta H , Θ , et in iis positi sunt duo anguli BHG , $E\Theta Z$. Dico, arcum BG arcui EZ aequalem esse.

Demonstratio. In arcubus BAG , EDZ duo quaelibet puncta sumimus, eaque supponimus duo puncta A , D esse. Lineas AB , AG , DE , DZ , BG , EZ ducimus. Quoniam igitur duae lineae BH , HG duabus lineis $E\Theta$, ΘZ aequales sunt, et


¹⁻¹⁾ Haec uerba apud Gherardum Cremonensem (p. 134, 18) desunt.

خطى $\overline{هـ ط ز}$ وزاوية $\overline{ب ح ج}$ مساوية لزاوية $\overline{هـ ط ز}$ فحسب برهان ٤
 من ١ تكون قاعدة $\overline{ب ج}$ مثل قاعدة $\overline{هـ ز}$ ومن اجل ان زاويتي
 $\overline{ب ح ج}$ $\overline{هـ ط ز}$ على المركزين وزاويتي $\overline{ب ا ج}$ $\overline{هـ د ز}$ على المحيطين فحسب
 برهان ٥ من ج تكون زاوية $\overline{ب ح ج}$ ضعف زاوية $\overline{ب ا ج}$ وزاوية $\overline{هـ ط ز}$
 ضعف زاوية $\overline{هـ د ز}$ فزاوية $\overline{ب ا ج}$ اذن مساوية لزاوية $\overline{هـ د ز}$ فقطعة $\overline{ب ا ج}$
 تُشَبِّهُ قطعة $\overline{هـ د ز}$ وهما من دائرتين متساويتين فمِنْ اجل ان
 خطى $\overline{ب ج}$ $\overline{هـ ز}$ متساويان وعليهما قطعتا $\overline{ب ا ج}$ $\overline{هـ د ز}$ المتشابهتان
 فحسب برهان ٦ من ج تكون قطعة $\overline{ب ا ج}$ مساوية لقطعة $\overline{هـ د ز}$
 وفرضنا دائرة $\overline{ب ا ج}$ مساوية لدائرة $\overline{هـ د ز}$ واذا اسقطنا مِنَ المتساوية
 متساويةً فان الباقي يكون متساويًا فقوس $\overline{ب ج}$ مساوية
 لقوس $\overline{هـ ز}$ فقد ظهر ان الزوايا المتساوية اذا كانت في الدوائر
 المتساوية على المراكز كانت او على المحيطات فانها على قسَى
 متساوية وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل السادس والعشرون مِنَ المقالة الثالثة

اذا كانت في دوائر متساوية زوايا على قسَى متساوية فالزوايا
 متساويةً على المراكز كانت او على المحيطات مثاله ان دائرتى $\overline{ا ب ج}$
 $\overline{د هـ ز}$ متساويتان وقوسى $\overline{ب ج}$ $\overline{هـ ز}$ متساويتان والمركزان نقطتا $\overline{ط ح}$
 وعليهما زاويتا $\overline{ب ط ج}$ $\overline{هـ ز}$ توترهما قوسا $\overline{ب ج}$ $\overline{هـ ز}$ المتساويتان فاقول
 ان زاوية $\overline{ب ط ج}$ مساوية لزاوية $\overline{هـ ز}$ لا يُمكن الا ذلك فان امكن
 فلتكن زاوية $\overline{ب ط ج}$ اصغرَ مِنَ زاوية $\overline{هـ ز}$ ونعمل على نقطة $\overline{ح}$ مِنْ

$\angle BHG - E\theta Z$, ex I, 4 basi BG basi EZ aequalis est. Et quoniam duo anguli BHG , $E\theta Z$ ad duo centra positi sunt et duo anguli BAG , EDZ ad duos ambitus, ex III, 19 angulus BHG angulo BAG et angulus $E\theta Z$ angulo EDZ duplo maior est; quare $\angle BAG - EDZ$. Uerum segmentum BAG segmento EDZ simile est,



quoniam utrumque duorum circulorum inter se aequalium sunt. Et quoniam duae lineae BG , EZ inter se aequales sunt, et in iis posita sunt duo segmenta BAG , EDZ inter se similia, ex III, 23 segmentum BAG segmento EDZ aequale erit. Supposuimus autem, circulum BAG circulo EDZ aequalem esse. Subtractis igitur magnitudinibus inter se aequalibus a magnitudinibus inter se aequalibus, quae relinquuntur aequalia sunt. Itaque arcus BG arcui EZ aequalis est.

Ergo manifestum est, angulos inter se aequales in circulis inter se aequalibus, siue ad centra siue ad ambitus positi sint, in arcubus inter se aequalibus positos esse. Q. n. e. d.

Propositio XXVI libri tertii.

Si in circulis inter se aequalibus anguli in arcubus inter se aequalibus positi sunt, anguli inter se aequales erunt, siue ad centra siue ad ambitus positi sunt.

Exemplificatio. Duo circuli ABG , DEZ inter se aequales sunt, et duo arcus BG , EZ inter se aequales, et centra sunt duo puncta θH , et ad ea sunt duo anguli $B\theta G$, EHZ , quibus duo arcus inter se aequales BG , EZ oppositi sunt. Dico, angulum $B\theta G$ angulo EHZ aequalem esse.


Nihil aliud fieri potest. Nam si fieri potest, angulus $B\theta G$ angulo EHZ minor sit. Ad punctum H lineae EH ex I, 23 an-

خط $\overline{هـ ح}$ زاوية $\overline{هـ ك}$ مساوية لزاوية $\overline{ب ط ج}$ كما يُبين عملها ببرهان
 كج من ا فين اجل ان دائرتي $\overline{ا ب ج}$ $\overline{د هـ ز}$ متساويتان وعلى مركزيهما
 زاويتا $\overline{ب ط ج}$ $\overline{هـ ك}$ المتساويتان فبحسب برهان كه من ج تكون
 قوس $\overline{ب ج}$ مساوية لقوس $\overline{هـ ك}$ لكننا فرضنا قوس $\overline{ب ج}$ مساوية لقوس
 $\overline{هـ ز}$ فقوس $\overline{هـ ز}$ اذن مساوية لقوس $\overline{هـ ك}$ العظمى مثل الصغرى
 هذا خلف غير ممكن فليست اذا زاوية $\overline{ب ط ج}$ باصغر من
 زاوية $\overline{هـ ز}$ ولا هي ايضا اعظم منها فهي اذن مثلها وذلك ما اردنا
 ان نبين .

الشكل السابع والعشرون من المقالة الثالثة

الوتر المتساوية في الدوائر المتساوية تفصل قياسا متساوية
 والوتر الاعظم يفصل قوسا اعظم مثاله ان دائرتي $\overline{ا ب ج}$ $\overline{د هـ ز}$ متساويتان
 وفيهما وترا $\overline{ب ج}$ $\overline{هـ ز}$ متساويان فاقول ان قوسي $\overline{ب ج}$ $\overline{هـ ز}$ متساويتان
 برهانه انا نستخرج المركزين وليكونا نقطتي $\overline{ط ح}$ ونخرج منهما
 خطوط $\overline{ط ب}$ $\overline{ط ج}$ $\overline{هـ ز}$ $\overline{هـ ك}$ فمن اجل ان دائرتي $\overline{ب ا ج}$ $\overline{هـ د ز}$ متساويتان
 فان خطي $\overline{ب ط}$ $\overline{ط ج}$ مساويان لخطي $\overline{هـ ح}$ $\overline{ح ز}$ وخط $\overline{ب ج}$ فرض مساويا
 لخط $\overline{هـ ز}$ فبحسب برهان ح من ا تكون زاوية $\overline{ب ط ج}$ مساوية لزاوية
 $\overline{هـ ز}$ فين اجل ان دائرتي $\overline{ا ب ج}$ $\overline{د هـ ز}$ متساويتان وعلى مركزيهما ^{45 u.}
 زاويتا $\overline{ب ط ج}$ $\overline{هـ ز}$ المتساويتان فانه بحسب برهان كه من ٣ تكون
 قوس $\overline{ب ج}$ مساوية لقوس $\overline{هـ ز}$ واذا اسقط من الدوائر المتساوية قطع
 متساوية فان القطع الباقية تكون متساوية فقوس $\overline{ب ا ج}$ ايضا مساوية

gulum EHK angulo $B\theta G$ aequalem construimus. Iam quoniam duo circuli ABG , DEZ inter se aequales sunt et ad contra eorum positi sunt duo anguli $B\theta G$, EHK inter se aequales, ex III, 25 arcus BG arcui EK aequalis erit. Sed supposuimus, arcum BG arcui EZ aequalem esse. Itaque arcus EZ arcui EK aequalis erit, maior minori. Quod absurdum est neque fieri potest. Itaque angulus $B\theta G$ neque minor est angulo EHZ neque maior; ergo ei aequalis erit. Q. n. e. d.




Propositio XXVII libri tertii.

In circulis inter se aequalibus chordae inter se aequales arcus inter se aequales abscindunt, et chorda maior arcum maiorem abscindit.

Exemplificatio. In duobus circulis ABG , DEZ inter se aequalibus duae chordae BG , EZ inter se aequales sunt. Dico, duos arcus BG , EZ inter se aequales esse.

Demonstratio. Duo centra sumimus, quae sint duo puncta θ , H , et ab iis lineas θB , θG , HE , HZ ducimus. Quoniam duo circuli BAG , EDZ inter se aequales sunt, duae lineae $B\theta$, θG duabus lineis EH , HZ aequales sunt. Linea autem BG lineae EZ aequalis data est; itaque ex I, 8 angulus $B\theta G$ angulo EHZ aequalis erit. Et quoniam duo circuli ABG , DEZ inter se aequales sunt, et ad eorum centra positi sunt duo anguli inter se aequales $B\theta G$, EHZ , ex III, 25 arcus BG arcui EZ aequalis erit. Et segmentis inter se aequalibus a circulis inter



لقوس $\overline{هـ د ز}$ فقد تبين ان الاوتار المتساوية في الدوائر المتساوية
تفصل قسماً متساوية وذلك ما اردنا ان نبين

الشكل الثامن والعشرون من المقالة الثالثة

القسي المتساوية من الدوائر المتساوية تفصلها اوتار متساوية
مثال ان دائرتي $\overline{ا ب ج}$ $\overline{د ه ز}$ متساويتان ونفصل منهما قوسى $\overline{ب ج ه ز}$
متساويتين فاقول ان وتريهما متساويان برهانه انا نستخرج مركزى
الدائرتين وليكونا نقطتى $\overline{ط ح}$ ونخرج خطوط $\overline{ط ب ط ج ه ح ز}$
ووترى $\overline{ب ج ه ز}$ فمن اجل ان دائرتي $\overline{ا ب ج}$ $\overline{د ه ز}$ متساويتان وقد فصل
منهما قوساً $\overline{ب ج ه ز}$ المتساويتان فبحسب برهان كو من ج تكون
زاوية $\overline{ب ط ج}$ مساوية لزاوية $\overline{ه ح ز}$ وايضا فمن اجل ان دائرتي $\overline{ا ب ج}$
 $\overline{د ه ز}$ متساويتان وقد خرج من المركزين الى المحيط خطوط فهي
اذن متساوية فخطا $\overline{ط ب ط ج}$ مساويان لخطى $\overline{ح ه ه ز}$ وزاوية $\overline{ط ب ج}$
مساوية لزاوية $\overline{ح ه ز}$ فبحسب برهان ك من ا^١ تكون قاعدة $\overline{ب ج}$
مساوية لقاعدة $\overline{ه ز}$ فقد تبين ان القسي المتساوية من الدوائر
المتساوية تفصلها اوتار متساوية وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل التاسع والعشرون من المقالة الثالثة

نريد ان نبين كيف نقسم قوساً مفروضة بنصفين فننزل انها
قوس $\overline{ب ا ج}$ فنخرج وترها وهو خط $\overline{ب ج}$ ونقسمه بنصفين على نقطة
 $\overline{د}$ ونقيم على نقطة $\overline{د}$ خطاً على زاوية قائمة وننفذه الى قوس $\overline{ب ا ج}$


se aequalibus subtractis segmenta, quae relinquuntur, inter se aequalia erunt. Quare etiam arcus BAG arcui EDZ aequalis erit. Ergo demonstratum est, chordas inter se aequales in circulis inter se aequalibus arcus inter se aequales abscindere. Q. n. e. d.

Propositio XXVIII libri tertii.

Arcus inter se aequales circulorum inter se aequalium chordae inter se aequales abscindunt.

Exemplificatio. A duobus circulis ABG , EDZ inter se aequalibus duos arcus BG , EZ inter se aequales abscindimus. Dico, chordas eorum inter se aequales esse.

Demonstratio. Duo centra duorum circulorum sumimus, quae duo puncto Θ , H sint, lineasque ΘB , ΘG , HE , HZ et duas chordas BG , EZ ducimus. Quoniam duo circuli ABG , DEZ inter se aequales sunt, et ab iis duo arcus GB , EZ inter se aequales abscisi sunt, ex III, 26 angulus $B\Theta G$ angulo EHZ aequalis erit. Rursus quoniam duo circuli ABG , DEZ inter se aequales sunt, lineae a duobus centris ad ambitum ductae inter se aequales erunt; duae igitur lineae ΘB , ΘG duabus lineis HE , EZ aequales sunt, et angulus Θ angulo H aequalis erit; itaque ex I, 20¹⁾ basis BG basi EZ aequalis erit. Ergo iam demonstratum est, arcus inter se aequales circulorum



inter se aequalium chordas inter se aequales abscindere. Q. n. e. d.

Propositio XXIX libri tertii.

Demonstrare uolumus, quo modo datum arcum in duas partes aequales diuidamus.

¹⁾ Sic a librario correctum pro: ٣٩ من ج (III, 26). Scr. I, 4.


وليكن خط \overline{AD} ونخرج خطي \overline{AB} \overline{AC} فمن اجل ان خط \overline{BD} فصلناه
 مثل خط \overline{DC} وناخذ خط \overline{DA} مشتركاً فخطا \overline{BD} \overline{DA} مثل خطي
 \overline{CD} \overline{DA} وزاوية \overline{BDA} مساوية لزاوية \overline{CDA} فقاعدت \overline{AB} مساوية لقاعدة
 \overline{AC} ومن اجل ان الاوتار المتساوية من الدوائر المتساوية تفصل
 قسماً متساوية فبحسب برهان كز من ج تكون قوس \overline{AB} مساوية
 لقوس \overline{AC} فقد قسمنا قوس \overline{BAC} بنصفين على نقطة \overline{A} وذلك ما
 اردنا ان نبين .

الشكل الثلثون من المقالة الثالثة

الزوايا المستقيمة الخطيين التي تقع في دائرة ما كان منها في
 نصف دائرة فهو قائم وما كان منها في قطعة اعظم من نصف
 دائرة فهو حاد وما كان منها في قطعة اصغر من نصف دائرة
 فهو منفرج واما الزاوية التي يحيط بها خط الوتر وخط القوس فان
 القطعة ان كانت اعظم من نصف دائرة فالزاوية منفرجة وان
 كانت اصغر من نصف دائرة فالزاوية حادة مثاله ان دائرة \overline{AB}
 وقع على خط محيطها زوايا \overline{ADB} \overline{ACB} وزاوية \overline{ADB} في قطعة \overline{ADB}
 وهي نصف دائرة وزاوية \overline{ACB} في قطعة \overline{ACB} وهي اعظم من نصف
 دائرة وزاوية \overline{ACD} في قطعة \overline{ACD} وهي اصغر من نصف دائرة فاقول ان
 زاوية \overline{ACD} منفرجة وزاوية \overline{ACB} حادة وزاوية \overline{ADB} قائمة برهانه انا 46 r
 نخرج قطر \overline{AB} ونستخرج المركز وهو نقطة \overline{P} ونصل \overline{PD} فمن اجل
 ان نقطة \overline{P} مركز للدائرة وقد خرج منها الى المحيط خطوط \overline{PA} \overline{PB}
 \overline{PD} فهي اذن متساوية فمثلث \overline{PAD} متساوي الساقين فبرهان \overline{D} من

Supponimus, arcum esse BAG . Chordam eius, scilicet lineam BG , ducimus eamque in puncto D in duas partes aequales diuidimus. Lineam in puncto D perpendicularem erectam ad arcum BAG producimus, sitque linea AD . Duas lineas AB , AG ducimus. Quoniam lineam BD lineae DG aequalem abscidimus, linea DA communi sumpta duae lineae BD , DA duabus lineis GD , DA aequales erunt. Et $\angle BDA = GDA$; itaque basis AG basi AB aequalis erit. Quoniam autem chordae inter se aequales circulorum inter se aequalium arcus inter se aequales abscindunt, ex III, 27 arcus AB arcui AG aequalis erit.

Ergo arcum BAG in puncto A in duas partes aequales diuidimus. Q. n. e. d.



Propositio XXX libri tertii.

Angulorum rectilineorum in circulo positorum qui in semicirculo sunt, recti sunt, qui in segmento semicirculo maiore, acuti, qui in segmento semicirculo minore, obtusi; angulus uero lineis chordae arcusque comprehensus obtusus est, ubi segmentum semicirculo maius est, ubi autem segmentum semicirculo minus est, acutus est angulus.

Exemplificatio. In ambitu circuli AB anguli ADB , DAB , AZD cadunt, quorum angulus ADB in segmento ADB positus est, quod semicirculus est, angulus DAB in segmento $DAGB$, quod semicirculo maius est, angulus AZD in segmento AZD , quod semicirculo minus est. Dico, angulum AZD obtusum, angulum DAB acutum, angulum ADB rectum esse.

Demonstratio. Diametro AB ducto et puncto Θ [scr. E] centro sumpto [lineam] ED ducimus. Quoniam punctum E centrum circuli est; et lineae ab eo ad ambitum ductae sunt EA , EB , ED , inter se aequales erunt, et triangulus EAD aequicru-

ا تكون زاوية $\overline{هـ\ د}$ مساوية لزاوية $\overline{هـ\ ا}$ فمن اجل ان زاوية $\overline{هـ\ ب}$ خارجة من المثلث فبرهان لب من ا تكون زاوية $\overline{هـ\ ب}$ مساوية لزاويتي $\overline{هـ\ ا}$ $\overline{هـ\ ب}$ فزاوية $\overline{هـ\ ب}$ اذن ضعف زاوية $\overline{ا\ د}$ وبمثل هذا البرهان والاستشهاد يتبين ان زاوية $\overline{ا\ د}$ ضعف زاوية $\overline{هـ\ ب}$ فمجموع زاويتي $\overline{هـ\ ا}$ $\overline{هـ\ ب}$ ضعف جميع زاوية $\overline{ا\ ب}$ ومن اجل انه اذا قام خطٌ على خطٍ فان الزاويتين اللتين عن جنبتيه اما قائمتان واما مساويتان لقائمتين فبرهان يـ من ا فان مجموع زاويتي $\overline{هـ\ ا}$ $\overline{هـ\ ب}$ مساو لزاويتين قائمتين وهو ضعف زاوية $\overline{ا\ ب}$ فزاوية $\overline{ا\ ب}$ اذن قائمةٌ . وايضا فمن اجل ان مثلث $\overline{ا\ ب}$ فيه زاوية قائمة وهي زاوية $\overline{ا\ ب}$ فبرهان يز من ا تكون زاوية $\overline{ا\ ب}$ حادة وهي في قطعة $\overline{ا\ ج}$ التي هي اعظم من نصف دائرة . وايضا فان زاوية $\overline{ا\ ب}$ حادة لانها في مثلث $\overline{ا\ ب}$ القائم الزاوية ومن اجل ان سطح $\overline{ا\ ب}$ ذو اربعة اضلاع في دائرة $\overline{ا\ ب}$ فبرهان كا من ج فان كل زاويتين منه تتقابلان مساويتان لزاويتين قائمتين وزاويتا $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ا\ د}$ متقابلتان فهما اذا جميعاً مساويتان لزاويتين قائمتين وزاوية $\overline{ا\ ب}$ منهما قد بينا انها حادة فيبقى اذن زاوية $\overline{ا\ د}$ اعظم من زاوية قائمة فهي اذن منفرجة وهي في قطعة $\overline{ا\ د}$ التي هي اصغر من نصف دائرة فقد تبين ان كل نصف دائرة فان الزاوية المستقيمة الحطيين الواقعة على محيطها تكون قائمة وكل قطعة هي اعظم من نصف دائرة فان الزاوية المستقيمة الحطيين الواقعة فيها تكون حادة وكل قطعة هي اصغر من نصف دائرة فان الزاوية المستقيمة الحطيين الواقعة ⁽¹⁾ على

¹⁾ In textu فيها erasum.

rius; quare ex I, 5 $\angle EAD = EDA$. Et quoniam angulus DEB ad triangulum extrinsecus positus est, ex I, 32 angulus DEB duobus angulis EAD , EDA aequalis est; quare angulus DEB angulo EDA duplo maior erit. Eadem demonstratione et eadem ratione demonstramus, angulum AED angulo EDB duplo maiorem esse. Itaque summa duorum angulorum DEA , DEB toto angulo ADB duplo maior est. Quoniam autem, si linea in linea erecta est, duo anguli ad utramque partem eius positi aut recti aut duobus rectis aequales sunt, ex I, 13 summa duorum angulorum DEA , DEB duobus rectis aequalis est. Ea autem angulo ADB duplo maior est. Ergo angulus ADB rectus est.

Rursus, quoniam in triangulo ADB angulus rectus est ADB , ex I, 17 angulus DAB acutus est. Et hic angulus positus est in segmento $DAGB$, quod semicirculo maius est.

Rursus angulus ABD acutus est, quia in triangulo rectangulo positus est. Et quoniam spatium $ABDZ$ quadrilaterum est in circulo AB positum, ex III, 21 duo anguli eius oppositi duobus rectis aequales erunt; itaque duo anguli oppositi AZD , ABD simul sumpti duobus rectis aequales erunt. Eorum autem angulum ABD acutum esse, iam demonstraui; relinquitur igitur angulus AZD angulo recto maior ergo obtusus. Et hic angulus positus est in segmento AZD , quod semicirculo minus est. Ergo iam demonstratum est, in semicirculo angulum rectilineum in ambitu cadentem rectum, in segmento semicirculo maiore, angulum rectilineum in eo cadentem acutum, in segmento semicirculo minore angulum rectilineum in ambitu cadentem obtusum esse. Q. n. e. d.

Rursus dico, angulum arcu BD et chorda DA comprehensum obtusum esse, qui angulus est segmenti $[AGD$, angulum autem arcu ZD et chorda DA comprehensum acutum, qui angulus est segmenti] AZD .

Demonstratio. Lineam BD in directum ad punctum H producimus. Quoniam angulus ADB rectus est, chorda BD


يحيطها تكون منفرجة وذلك ما اردنا ان نبين . وايضا اقول ان الزاوية التي يحيط بها قوس $\overline{ب د}$ وتر $\overline{د ا}$ منفرجة وهي زاوية قطعة $\overline{ا د}$ برهانه انا نخرج خط $\overline{ب د}$ على الاستقامة الى نقطة $\overline{ح}$ فلان زاوية $\overline{ا د ب}$ قائمة فانا متى رفعنا وتر $\overline{ب د}$ كانت الزاوية التي يحيط بها قوس $\overline{ب د}$ وخط $\overline{ا د}$ اعظم من قائمة فهي اذن منفرجة ومن اجل ان خط $\overline{ا د}$ قائم على خط $\overline{ب ح}$ المستقيم وزاوية $\overline{ا د ب}$ قائمة فان زاوية $\overline{ا د ح}$ ايضا تكون قائمة وذلك بين برهان $\overline{ي م ا}$ فاذا اسقطنا الزاوية التي يحيط بها تقبيب $\overline{ز د}$ وخط $\overline{د ح}$ بقيت الزاوية التي يحيط بها قوس $\overline{ز د}$ وخط $\overline{ا د}$ حادة وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل الواحد والثلاثون من المقالة الثالثة

كل دائرة ماسها خط مستقيم واخرج من نقطة الماسة خط اخر مستقيم يقطع الدائرة على غير المركز فان الزاويتين اللتين تقعان عن جنبتيه مساويتان للزاويتين اللتين تقعان في قطعتي الدائرة المتبادلتين مثاله ان دائرة $\overline{ا ب}$ يماسها خط $\overline{د ه}$ على نقطة $\overline{ب}$ وقد خرج من نقطة $\overline{ب}$ خط $\overline{ب ز}$ يقطع الدائرة على غير المركز فاقول ان زاويتي $\overline{ز ب د}$ و $\overline{ز ب ه}$ مساويتان للزاويتين اللتين تقعان في قطعتي $\overline{ز ا ب}$ و $\overline{ز ط ب}$ اما زاوية $\overline{ز ب د}$ فهي مساوية للزاوية التي تقع في قطعة $\overline{ز ا ب}$ واما زاوية $\overline{ز ب ه}$ فمساوية للزاوية التي تقع في قطعة $\overline{ب ط ز}$.
برهانه انا نعلم على قوس $\overline{ز ب}$ علامة $\overline{ا ي ن}$ وقعت منها¹⁾ فنزل انها

¹⁾ In textu $\overline{فان}$ erasum.

erecta angulus arcu BD et linea AD comprehensus recto maior erit, ergo obtusus. Et quoniam in linea recta BH erecta est linea AD , et angulus ADB rectus est, etiam angulus ADH rectus est; quod ex I, 13 manifestum est. Ergo angulo, qui arcu conuexo ZD et linea DH comprehenditur, subtracto relinquitur angulus arcu ZD et linea AD comprehensus acutus. Q. n. e. d.



Propositio XXXI libri tertii.

Si recta linea circulum contingit, et a puncto contactus alia linea recta ducitur, quae circulum non per centrum secat, duo anguli ad utramque partem eius positi aequales sunt duobus angulis, qui in duobus segmentis circuli alternis positi sunt.

Exemplificatio. Circulum AB linea DE in puncto B contingit. A puncto B ducitur linea BZ , quae circulum non per centrum secat. Dico, duos angulos ZBD , ZBE aequales esse duobus angulis, qui in duobus segmentis $ZAGB$, $Z\theta B$ positi sint, hoc est angulum ZBD aequalem esse angulo in segmento $ZAGB$ posito, et angulum ZBE angulo in segmento $B\theta Z$ posito aequalem.

Demonstratio. In arcu ZB punctum quodlibet sumimus, quod punctum θ esse supponimus. Duabus lineis θZ , θB ductis centrum circuli sumimus, quod punctum H esse supponimus. Linea BHA ducta ex III, 17 manifestum est, lineam AHB ad lineam DE perpendicularem esse in puncto B ; quare angulus ABE rectus est.

Quoniam segmentum AZB semicirculus est, ex III, 30 añ-

علامة ط ونُخرج خطى طز طب ونستخرج مركز الدائرة فننزل انها نقطة ح ونُخرج خط بح فظاهر ببرهان يز من ج ان خط اح ب قائم على خط ده على زوايا قائمة على نقطة ب فزاوية ابه قائمة ومن اجل ان قطعة ازب نصف دائرة فببرهان ل من ج تكون زاوية ازب قائمة فاذا اخذنا زاوية ابز مشتركة كان مجموع زاويتي ازب ابز مساويا لجميع زاوية زبه لكن مجموع زاويتي زبه زب مساو لزاويتين قائمتين ولكن مجموع زوايا المثلث الثالث اعنى زوايا ابز ازب زاب مساو لزاويتين قائمتين فهى اذن مجموعة مثل زاويتي زب زه فاذا اسقطنا زاوية زبه فزاويتي ازب زبا بقيت زاوية زب مساوية لزاوية زاب وهى فى قطعة زاجب ومن اجل ان سطح ازطب ذو اربعة اضلاع فى دائرة اب فان كل زاويتين منه تتقابلان مساويتان لزاويتين قائمتين فزاويتا زاب زطب اذن مساويتان لزاويتين قائمتين فهما اذن مساويتان لزاويتي زب زه وقد بينا ان زاوية زاب مساوية لزاوية زب فتبقى زاوية زطب مساوية لزاوية زبه وهى فى قطعة بطز فقد تبين ان الزاويتين اللتين عن جنبتي خط زب مساويتان للزاويتين اللتين تقعان فى قطعتي الدائرة المتبادلتين وذلك ما اردنا ان نبين فان كان خط زب قطر الدائرة فبين البين ان كل واحد من الزاويتين اللتين عن جنبتيه قائمة ومساوية لكل واحدة من الزاويتين اللتين تقعان فى نصف الدائرة . شكل لايرن اذا كانت قطعة من دائرة معلومة نريد ان نبين كيف نتم الدائرة التى القطعة منها فلتكن القطعة التى عليها اب جد ونقسم قوس اب ب بنصفين


gulus AZB rectus erit. Angulo igitur ABZ communi sumpto summa duorum angulorum AZB , ABZ toti angulo ZBE aequalis erit. Summa autem duorum angulorum ZBE , ZBD duobus rectis aequalis est; uerum etiam summa trium angulorum trianguli, scilicet angulorum ABZ , AZB , ZAB , duobus rectis aequalis est; itaque coniuncti duobus angulis ZBD , ZBE aequales sunt. Ergo subtracto angulo ZBE et duobus angulis AZB , ZBA subtractis relinquitur angulus ZBD angulo ZAB in segmento $ZAGB$ posito aequalis.

Et quoniam spatium quadrilaterum $AZ\Theta B$ in circulo AB positum est, duo anguli eius oppositi duobus rectis aequales sunt; itaque duo anguli ZAB , $Z\Theta B$ duobus rectis aequales sunt et ea de causa duobus angulis ZBD , ZBE aequales. Sed iam demonstrauimus, angulum ZAB angulo ZBD aequalem esse; relinquitur igitur angulus $Z\Theta B$ [scr. ZBE] angulo ZBE [$Z\Theta B$] in segmento $B\Theta Z$ posito aequalis. Ergo iam demonstratum est, duos angulos ad utramque partem lineae ZB positos duobus angulis alternis in duobus segmentis circuli positos aequales esse. Q. n. e. d.

Si uero linea ZB diametrus circuli est, manifestum est, utrumque angulum ad utramque partem eius positum rectum esse et utrius ex duobus angulis in semicirculo positis aequalem.

Propositio Heronis. Segmento circuli dato demonstrare uolumus, quo modo circulum, cuius segmentum est, suppleamus.

Sit segmentum $ABGD$. Arcu ABG in duas partes aequales in puncto B diuiso a puncto B ad chordam AG perpendicularem BD ducimus. Chorda BG ducta in puncto G lineae BG angulum angulo DBG aequalem construimus. Si angulus angulo DBG




على نقطة $\bar{ب}$ ونُخرج من نقطة $\bar{ب}$ الى وتر $\bar{ا ج}$ عمود $\bar{ب د}$ ونُخرج وتر $\bar{ب ج}$ ونعمل على نقطة $\bar{ج}$ من خط $\bar{ب ج}$ زاوية مساوية لزاوية $\bar{د ب ج}$ فان كانت الزاوية المعبولة المساوية لزاوية $\bar{د ب ج}$ تقع مثل زاوية $\bar{ب ج د}$ وظاهر ان مركز الدائرة على نقطة $\bar{د}$ وان قطعة $\bar{ا ب ج}$ نصف دائرة وان كانت الزاوية المعبولة على نقطة $\bar{ج}$ المساوية لزاوية $\bar{د ب ج}$ تقع خارج قطعة $\bar{ا ب ج}$ كزاوية $\bar{ب ج ه}$ فان مركز الدائرة يقع^{١)} خارج قطعة $\bar{ا ب ج}$ كنقطة $\bar{ه}$ فتكون القطعة اصغر من نصف دائرة وان كانت الزاوية المعبولة على نقطة $\bar{ج}$ المساوية لزاوية $\bar{د ب ج}$ تقع داخل قطعة $\bar{ا ب ج}$ كزاوية $\bar{ب ج ز}$ فان مركز الدائرة يقع داخل قطعة $\bar{ا ب ج}$ على نقطة $\bar{ز}$ ^{٢)} فيظهر لنا ان القطعة المفروضة اعظم من نصف دائرة فاذن قد تبين كيف نُتم القطعة^{٣)} المفروضة اين وقع المركز على $\bar{ا ج}$ او داخله او خارجه وذلك ما اردنا ان نبين .: قال المُفسر قسم قوس $\bar{ا ج}$ بنصفين ليظهر ان وتر قوس $\bar{ا ب}$ مساو لوتر قوس $\bar{ب ج}$ لانه لو قسم خط $\bar{ا ج}$ بنصفين لكان يقتضى الشكل التاسع والعشرين وهو كيف نقسم قوساً معلومةً بنصفين وما كان يظهر له ان وتر قوس $\bar{ا ب}$ مساو لوتر قوس $\bar{ب ج}$ إلا بعد قسمته قوس $\bar{ا ب ج}$ بنصفين فبالواجب جعل هذا الشكل بعد ذلك الشكل وانما اراد ان يُبين ان الزاوية التي عند $\bar{ا}$ مساوية للزاوية التي عند $\bar{ج}$ اذا

١) In margine: قال الشيخ ويتوهم فيه خط $\bar{ا ه}$ Dixit uir doctissimus, eum lineam $\bar{ا ه}$ supposuisse.

٢) In margine: قال الشيخ ويتوهم فيه خط $\bar{ا ز}$ Dixit uir doctissimus, eum lineam $\bar{ا ز}$ supposuisse.

٣) Falso repetitum.

aequalis constructus ut angulus BGD cadit, manifestum est, centrum circuli esse in puncto D , et segmentum ABG semicirculum esse. Sin angulus ad punctum G angulo DBG aequalis constructus extra segmentum ABG cadit ut angulus BGE , centrum circuli extra segmentum ABG cadet ut punctum E . Itaque seg-



mentum semicirculo minus erit. Si autem angulus ad punctum G angulo DBG aequalis constructus intra segmentum ABG cadit ut angulus BGZ , centrum circuli cadet intra segmentum ABG in puncto Z . Itaque nobis manifestum erit, segmentum datum semicirculo maius esse. Ergo iam demonstratum est, quo modo segmentum datum suppleamus, siue centrum in AG siue intra siue extra cadit. Q. n. e. d.

Commentator dixit. Arcum AG in duas partes aequales diuisit, ut manifestum esset, chordam arcus AB chordae arcus BG aequalem esse. Nam si lineam AG in duas partes aequales diuississet, propositione XXIX opus fuisset,¹⁾ quae est, quo modo arcum datum in duas partes aequales diuidamus, neque ei manifestum fuisset, chordam arcus AB chordae arcus BG aequalem esse nisi post arcum ABG in duas partes aequales diuisum. Ergo necessario hanc propositionem post illam posuit. Sed hoc tantum demonstrare uoluit, angulum ad A positum angulo ad G posito aequalem esse, si angulus ad punctum G constructus ut angulus BGD caderet, ut demonstraretur, lineas DB , DG , DA inter se aequales esse, ut esset punctum centrum circuli, et simul ut demonstraretur, lineam AD lineae DG aequalem esse, quo adparet, centrum circuli esse in linea BD aut in ea in directum producta.

¹⁾ Textus Anaritii (Curtze p. 186) ualde corruptus est, nec Arabs satis clare exposuit, quod uult.

كانت الزاوية المعبولة على نقطة ج تقع كزاوية بجد ليتبين
ان خطوط دب دج دا متساوية لتكون النقطة¹⁾ مركزا للدائرة 47 r.
وايضا ليتبين لهُ ان خط اد مثل خط دج ليتبين ان مركز الدائرة
على خط بد او على الذي على استقامته .

الشكل الثاني والثلاثون من المقالة الثالثة

نريد ان نبين كيف نُقيم على خط مستقيم معلوم قطعة من
دائرة تقبل زاوية مثل زاوية معلومة اى زاوية كانت قائمة او منفرجة
او حادة مثاله ان خط اب الخط المعلوم والزاوية المعلومة القائمة
زاوية جده والمنفرجة زاوية حطك والحادة زاوية نسع فنريد ان
نبين كيف نُقيم [على] خط اب قطعة من دائرة تقبل زاوية مساوية
لزاوية جده ثم قطعة تقبل زاوية مساوية لزاوية حطك ثم قطعة
تقبل زاوية مساوية لزاوية نسع فنرسم خط اب في ثلاثة مواضع
ونبتدى برسم الصورة الاولى فنقسم خط اب بنصفين على نقطة ز
ونرسم على نقطة ز وببعد زا وزب دائرة اب فين اجل ان مركز دائرة
اب على خط اب فان خط اب قطر لدائرة اب والقطر يقسم الدائرة
بنصفين كما بين سنبلقيوس في مُصادرة المقالة الاولى فكل واحدة
من القطعتين اللتين على خط اب نصف دائرة وقد تبين ببرهان
ل من ج ان القطعة التى هى نصف دائرة تقبل زاوية قائمة فيُصف
الدائرة الذى على خط اب يقبل [زاوية] مثل زاوية جده القائمة وتتلو

¹⁾ Supra in margine correctum; in textu primum scriptum: القطعة

Propositio XXXII libri tertii.

Demonstrare uolumus, quo modo in linea recta data segmentum circuli erigamus, quod angulum capiat cuilibet angulo dato aequalem siue recto siue obtuso siue acuto.

Exemplificatio. Linea AB est linea data, angulus datus rectus angulus GDE , obtusus angulus HOK , acutus angulus NZO . Demonstrare uolumus, quo modo in linea AB segmentum circuli erigamus, quod capiat angulum angulo GDE aequalem, deinde segmentum, quod capiat angulum angulo HOK aequalem, deinde segmentum, quod capiat angulum angulo NZO aequalem.

Lineam AB tribus locis describimus et a prima figura describenda incipimus. Lineam AB igitur in puncto Z in duas partes aequales diuidimus et in puncto Z et radiis ZA et ZB circulum AB describimus. Quoniam centrum circuli AB in linea AB est, linea AB erit diametrus circuli AB . Et diametrus circulum in duas partes aequales diuidit, ut Simplicius in definitione*) libri primi demonstrauit. Itaque utrumque segmentum in linea AB positum semicirculus est. Sed iam in III, 30 demonstratum est, segmentum, quod semicirculus sit, angulum rectum capere. Ergo semicirculus in linea AB positus angulum angulo GDE recto aequalem capit.

Iam ad figuram secundam animum aduertimus. In puncto A lineae AB secundae ex I, 23 angulum angulo HOK obtuso aequalem construimus, qui sit angulus BAL , et in puncto A lineae AL lineam LM perpendicularem erigimus. Itaque manifestum est, angulum LAM rectum et angulum MAB acutum esse. Deinde in puncto B lineae AB angulum ABM angulo BAM aequalem construimus. Quoniam igitur in triangulo AMB duo anguli ad basim positi inter se aequales sunt, ex I, 6 linea MA lineae MB aequalis erit. Quare circulus centro M et radio MA descriptus per duo puncta A, B transit nec omnino a linea AL

*) U. Ananitus ed. Curtze p. 20 sqq.


بالصورة الثانية فنعمل على نقطة \bar{A} من خط \bar{AB} الثانى زاويةً مساويةً
 لزاوية \bar{H} طك المنفرجة كما بين عمله ببرهان \bar{K} من \bar{A} ولتكن
 زاوية \bar{B} \bar{A} ونقيم على نقطة \bar{A} من خط \bar{AB} خط \bar{AM} عموداً عليه فظاهر
 ان زاوية \bar{LAM} قائمة وزاوية \bar{MAB} حادة ثم نعمل على نقطة \bar{B} من
 خط \bar{AB} زاوية \bar{ABM} مساويةً لزاوية \bar{BAM} فمن اجل ان مثلث \bar{ABM}
 زاويتاه اللتان فوق القاعدة متساويتان فانه بحسب برهان \bar{O} من \bar{A}
 يكون خط \bar{M} \bar{A} مساوياً لخط \bar{MB} فاذن الدائرة المخطوطة على مركز
 \bar{M} وبُعْد \bar{MA} تجوز على نقطتي \bar{AB} ولا يقطع من خط \bar{AL} ولا الخط
 الذى على استقامته شيئاً لانها متى قطعت منه شيئاً كان الخط
 المستقيم القائم على طرف \bar{MA} على زاوية قائمة يقع داخل الدائرة
 وقد بين ببرهان \bar{Y} من \bar{B} انه يقع خارج الدائرة وانه مماسٌ
 للدائرة فخط \bar{AL} اذن مماسٌ للدائرة ومن اجل ان خط \bar{AL} يماس
 دائرة \bar{AB} وقد خرج من النقطة التى ¹⁾ عليها المماسه خط \bar{AB}
 فقطع الدائرة على غير المركز فبحسب برهان \bar{L} من \bar{B} تكون الزاوية
 التى تقع فى قطعة \bar{AB} الصغرى مساويةً لزاوية \bar{BAL} المبادلة لها
 لكن زاوية \bar{BAL} عملت مساويةً لزاوية \bar{H} طك المنفرجة فقد اقمنا
 على خط \bar{AB} فى الصورة الثانية قطعة \bar{AB} الصغرى تقبل زاويةً مساويةً
 لزاوية \bar{H} طك المنفرجة وذلك ما اردنا ان نبين . وبقي ان نبين
 كيف نعمل على خط \bar{AB} الثالث قطعةً دائرةً تقبل زاويةً مساويةً
 لزاوية \bar{N} سع الحادة فنعمل على خط \bar{AB} على نقطة \bar{A} زاويةً \bar{BAF}

¹⁾ Repetitum.

neque a linea in directum ab ea ducta secatur. Nam si omnino ab ea secaretur, linea recta in termino diametri MA ad rectos angulos erecta intra circulum caderet. Sed iam in III, 15 demonstrauius, eam extra circulum cadere et circulum contingere; linea AL igitur circulum contingit. Et quoniam linea AL circulum AB contingit, et a puncto contactus linea AB ducta est, circulum non per centrum secat. Uerum ex III, 31 angulus in segmento minore AB positus angulo BAL alterno aequalis est. Angulus autem BAL angulo $H\theta K$ obtuso aequalis constructus est. Ergo iam in linea AB figurae secundae segmentum minus AB ereximus, quod angulum angulo $H\theta K$ obtuso aequalem capit. Q. n. e. d.

Relinquitur, ut demonstremus, quo modo in linea AB tertia segmentum circuli construamus, quod angulum angulo $N\Xi O$ acuto aequalem capiat.

In puncto A lineae AB angulum BAF angulo $N\Xi O$ aequalem construimus. Quoniam angulus $N\Xi O$ acutus est, etiam angulus BAF acutus erit. In puncto A lineae AF [lineam] AQ perpendiculararem erigimus; angulus BAQ igitur acutus erit. Et ad punctum B lineae AB angulum ABQ angulo BAQ aequalem con-



مساويةً لزاوية ن س ع فمن اجل ان زاوية ن س ع حادة تكون زاوية
ب ا ف حادة ايضا فنقيم على ¹⁾ نقطة ا من خط ا ف عمود ا ف فزاوية
ب ا ف حادة فنعمل على نقطة ب من خط ا ب زاوية ا ب ق مساويةً
لزاوية ب ا ق فمن اجل ان زاويتي ا ب متساويتان فان ساقى ق ا
ق ب متساويتان فنقطه ق مركز الدائرة فالدائرة المرسومة على نقطة
ق وببعد ق ا تمر بنقطتى ا ب ولا تقطع من خط ا ف ولا الخط
الذى على استقامته شيا ولتكن دائرة ا ب ومن اجل ان خط ا ف
قائم على طرف قطر ق ا على زوايا قائمة فبحسب برهان يه من ج
يكون خط ا ف مماساً لدائرة ا ب من خارج ومن اجل ان خط ا ف
يماس دائرة ا ب وقد خرج من نقطة المماسه خط ا ب فقطع الدائرة
على غير المركز فان ببرهان لا من ج تكون الزاوية التى تقع فى
قطعة ا ب العظمى مساويةً لزاوية ن س ع فقد اقمنا على خط ا ب
المعلوم قطعة ا ب العظمى تقبل زاويةً مثل زاوية ن س ع الحادة
المعلومة وذلك ما اردنا ان نبين .

47 u.

الشكل الثالث والثلثون من المقالة الثالثة

نريد ان نبين كيف نفصل من دائرة معلومة قطعةً تقبل
زاويةً مساويةً لزاوية معلومة فنزل ان الدائرة المعلومة دائرة ا ب ج
والزاوية المعلومة زاوية د ه ز ونريد ان نبين كيف نفصل من دائرة
ا ب ج قطعةً تقبل زاويةً مساويةً لزاوية د ه ز فنحيز على اى نقطة

¹⁾ Repetitum.

struimus. Quoniam duo anguli A , B inter se aequales sunt, duo latera QA , QB inter se aequalia erunt. (Itaque punctum Q centrum est circuli.*) Quare circulus in puncto**) Q et radio QA descriptus per duo puncta A , B transit nec omnino a linea AF neque a linea in directum ab ea ducta secatur. Circulus sit AB . Et quoniam linea AF in termino diametri QA ad rectos angulos erecta est, ex III, 15 linea AF circulum AB extrinsecus continget. Et quoniam linea AF circulum AB contingit, et a puncto contactus linea AB ducta est, circulum non per centrum secat. Ex III, 31 igitur angulus in segmento AB maiore positus angulo $N\Xi O$ aequalis erit. Ergo in data linea AB segmentum AB maius ereximus, quod angulum dato angulo $N\Xi O$ acuto aequalem capit. Q. n. e. d.

Propositio XXXIII libri tertii.

Demonstrare uolumus, quo modo a circulo dato segmentum, quod angulum angulo dato aequalem capiat, abscindamus.

Circulum datum supponimus esse circulum ABG et angulum datum esse angulum DEZ . Demonstrare uolumus, quo modo a circulo ABG segmentum abscindamus, quod angulum angulo DEZ aequalem capiat.

Per quodlibet punctorum in ambitu circuli ABG positorum lineam ducimus circulum contingentem. Quod punctum supponimus esse punctum G , et per id ex III, 15 [scr. 16] lineam $H\Theta$ ducimus circulum ABG contingentem; et hoc ita fit, ut ad punctum G diametrum circuli ducamus et in termino diametri, qui ad punctum G est, ad rectos angulos lineam erigamus, scilicet lineam $H\Theta$. Linea $H\Theta$ igitur circulum contingit. Et in puncto G lineae $H\Theta$ angulum angulo DEZ aequalem construimus, qui sit angulus BGH . Quoniam linea $H\Theta$ circulum ABG contingit, et a puncto contactus linea GB ducta est, circulum extra cen-

*) Haec uerba male addita sunt.

**) [scr. centro].

اردنا من النقط التي على محيط دائرة $\overline{أب}$ خطا يُماس الدائرة فننزل ان النقطة نقطة $\overline{ج}$ ونجيز عليها خط $\overline{ح}$ يماس دائرة $\overline{أب}$ وذلك بحسب ما بينا ببرهان $\overline{ي}$ من $\overline{ج}$ وهو انا نجيز على نقطة $\overline{ج}$ قطر الدائرة ونقيم على طرف القطر الذي عند نقطة $\overline{ج}$ خطا على زاوية قائمة وهو خط $\overline{ح}$ فخط $\overline{ح}$ اذن مُماس للدائرة ونعمل على نقطة $\overline{ج}$ من خط $\overline{ح}$ زاوية مساوية لزاوية $\overline{دهز}$ ولتكن زاوية $\overline{بجح}$ فمن اجل ان خط $\overline{ح}$ يماس دائرة $\overline{أب}$ وقد خرج من العلامة التي عليها المُماس خط $\overline{ج}$ فقطع الدائرة على غير المركز فين البين^١ ببرهان لا من $\overline{ج}$ ان زاوية $\overline{بجح}$ مساوية للزاوية التي تقع في قطعة $\overline{بأ}$ المبادلة لها لكننا^٢ عملنا زاوية $\overline{بجح}$ مساوية لزاوية $\overline{دهز}$ فالزاوية التي في قطعة $\overline{بأ}$ مساوية لزاوية $\overline{دهز}$ فقد فصلنا من دائرة $\overline{أب}$ قطعة $\overline{بأ}$ تقبل زاوية مساوية لزاوية $\overline{دهز}$ وذلك ما اردنا ان نبين .:

الشكل الرابع والثلاثون من المقالة الثالثة


كل وترين يتقاطعان في دائرة فان السطح القائم الزوايا الذي يُحيط به احد قسبي [احد^٣] الخطين مع قسمة الاخر مساو للسطح القائم الزوايا الذي يُحيط به احد القسبين من الخط الاخر مع قسمة الاخر .: هذا التقاطع له ست جهات اما ان يكون التقاطع

^١) Sic correctum; scriba mihi videtur prius scripsisse: خطين

^٢) Sic in margine correctum. Librarius prius scripsit: لكننا

^٣) Cfr. Al-Thusium. Ed. Rom. p. 87.

trum secat. Itaque ex III, 31 manifestum est, angulum BGH angulo alterno, qui in segmento BAG positus sit, aequalem esse. Sed angulum BGH angulo DEZ aequalem construximus. Itaque angulus in segmento BAG positus angulo DEZ aequalis est. Ergo iam a circulo ABG segmentum BAG abscidimus, quod angulum angulo DEZ aequalem capit. Q. n. e. d.



Propositio XXXIV libri tertii.

Si in circulo duae chordae inter se secant, rectangulum una parte [alterius] duarum linearum cum altera parte comprehensum aequale est rectangulo comprehenso una parte alterius lineae cum altera parte.


Sex sunt huius sectionis rationes, aut ut sectio utriusque lineae in centro sit, aut ut altera per centrum ducta sit et alteram in duas partes aequales secet et ad angulos rectos, aut ut altera per centrum ducta sit, sed alteram in duas partes aequales non secet, aut ut neutra per centrum ducta sit et altera alteram in duas partes aequales secet, aut ut neutra per centrum ducta sit et altera alteram nec in duas partes aequales nec ad angulos rectos secet, aut ut neutra per centrum ducta sit nec altera alteram in duas partes aequales secet, sed inter se ad angulos rectos secant.

Ponimus igitur sex deinceps casus difficiles, I, II, III, IV, V, VI, et sex circuli sint, et in singulis $ABGD$.

Sit primus circulus $ABGD$, in quo duae chordae in centro E inter se secant. Dico, rectangulum duabus partibus AE , EG comprehensum rectangulo duabus partibus BE , ED comprehenso aequale esse.


لهما جميعا على المركز واما ان يكون احدهما يمر بالمركز ويُقَاطِعُ
 الاخر بنصفين وعلى زوايا قائمة واما ان يمر احدهما على المركز ولا
 يُقَاطِعُ الاخر بنصفين واما ان لا يمر بالمركز ويُقَاطِعُ احدهما الاخر
 بنصفين واما ان لا يمر بالمركز ولا يقاطع احدهما الاخر بنصفين
 ولا على زوايا قائمة واما ان لا يمر بالمركز ولا يُقَاطِعُ احدهما الاخر
 بنصفين لكنهما يتقاطعان على زوايا قائمة فنَجْعَلُ اذن لذلك
 ستَّ صُعَبٍ^(١) متواليَّةً اولى وثانيةً وثالثةً ورابعةً وخامسةً وسادسةً
 ولتكن ستَّ دوائر على كل دائرة منها ا ب ج د فلتكن الدائرة الاولى
 عليها ا ب ج د يتقاطَعُ فيها القطران على مركز ه فاقول ان القائم
 الزوايا الذى يُحِيطُ به قسما ا ه هـ مساو للقائم الزوايا الذى يحيط
 به قسما ب ه هـ برهانه من اجل ان نقطة ه مركز لدائرة ا ب ج د
 فالخطوط الاربعة متساوية هـ ا ب هـ ج هـ لانها خرجت من المركز
 الى المحيط فالقائم الزوايا الذى يحيط به قسما ا ه هـ مساو للقائم
 الزوايا الذى يحيط به خطا ب ه هـ وذلك ما اردنا ان نبين .
 وايضا فان في الصورة الثانية قاطع قطر ب د وتر ا ج بنصفين على
 نقطة ه فظاهر برهان ج من ج انهما يتقاطعان على زوايا قائمة
 ومركز الدائرة ز ونصل ا ز فمن اجل ان خط ب د قد قُسم بنصفين
 على نقطة ز وبقسامين مختلفين على نقطة ه فانه بحسب برهان هـ
 من ب يكون القائم الزوايا^(٢) الذى يحيط به خطا ب ه هـ مع المربع
 الكائن من خط ز ه مساويا للمربع الكائن من خط ز د لكن خط
 ا ز مساو لخط ز د فاذن القائم الزوايا الذى يحيط به خطا ب ه هـ مع
 المربع الكائن من خط ز ه مساو للمربع الكائن من خط ا ز لكن

Demonstratio. Quoniam punctum E centrum est circuli $ABGD$, quattuor lineae EA , EB , EG , ED inter se aequales sunt, quia a centro ad ambitum ductae sunt. Itaque rectangulum duabus partibus AE , EG comprehensum rectangulo duabus partibus BE , ED comprehenso aequale erit. Q. n. e. d.



Rursus in figura secunda diametrus BD chordam AG in duas partes aequales in puncto E secat. Ex III, 3 igitur manifestum est, eas ad angulos rectos inter se secare.

Centrum circuli Z est. AZ ducimus. Quoniam igitur linea BD in puncto Z in duas partes aequales, in puncto E in duas partes inaequales diuisa est, ex II, 5 rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae ZE



quadrato lineae ZD aequale erit. Sed linea AZ lineae ZD aequalis est; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae ZE quadrato lineae AZ aequale erit. Ex I, 46 autem quadratum lineae AZ summae duorum quadratorum duarum linearum ZE , EA aequale est; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae ZE summae duorum quadratorum duarum linearum ZE , EA aequale erit. Quadrato lineae ZE subtracto relinquitur rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum quadrato lineae AE aequale. Sed linea AE lineae EG aequalis est. Itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum rectangulo duabus lineis AE , EG comprehenso aequale est. Q. n. e. d.

¹⁾ In margine clarius scriptum. ²⁾ In cod.: الزاوية


بحسب برهان مو من ا فان المربع الكائن من خط از مساو لجموع
المربعين الكائنين من خطي زه ا فالقائم الزوايا الذي يحيط به
خطا به د مع المربع الكائن من خط زه مساو لجموع المربعين
الكائنين من خطي زه ا فاذا اسقطنا المربع الكائن من خط زه
بقي القائم الزوايا الذي يحيط به خطا به د مساويا للمربع
الكائن من خط اه لكن خط اه مساو لخط هج فالقائم الزوايا الذي
يحيط به خطا (ا) به د مساو للقائم الزوايا الذي يحيط به خطا
اه هج وذلك ما اردنا ان نبين .

وايضا في الصورة الثالثة تقاطع قطر ب د ووتر اج على زوايا غير
قائمة على نقطة ه فبين ببرهان ج من ج ان نقطة ه ليست على
منصف وتر اج فليكن خط جه اعظم من خط اه ونخرج من المركز
وهو نقطة ز الى خط اج عمود زح كما بين اخراجه ببرهان يب من
ا فظاهر ببرهان ج من ج ان عمود زح يقسم وتر اج بنصفين على
نقطة ح فخط اج قد قسم بنصفين على نقطة ح وبقسمين مختلفين
على نقطة ه فببرهان ه من ب يكون القائم الزوايا الذي يحيط به
خطا جه ا مع المربع الكائن من خط ح ه مساويا للمربع الكائن
من خط اح وناخذ مربع خط زح مشتركا فالقائم الزوايا الذي
يحيط به خطا جه ا مع المربعين الكائنين من خطي هح زح مساو
لجموع المربعين الكائنين من خطي زح ح ا لكن بحسب برهان
مو من ا¹) فان مجموع المربعين الكائنين من خطي زح ح ا مساو
للمربع الكائن من خط ز د المساوي لخط ز ا فالقائم الزوايا الذي
يحيط به خطا جه ا مع المربعين الكائنين من خطي هح زح مساو

Rursus in figura tertia diametrus BD et chorda AG ad angulos non rectos in puncto E inter se secant.

Ex III, 3 manifestum est, punctum E in media chorda AG non esse. Sit linea GE linea AE maior. A centro, quod sit punctum Z , ad lineam AG ex I, 12 perpendicularem ZH ducimus; itaque ex III, 3 manifestum est, perpendicularem ZH chordam AG in puncto H in duas partes aequales diuidere. Linea AG igitur in puncto H in duas partes aequales, in puncto E in duas partes inaequales diuisa est; itaque ex II, 5 rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum quadrato lineae HE aequale erit quadrato lineae AH . Quadrato lineae ZH communi sumpto rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum duobus quadratis duarum linearum EH , ZH aequale est summae duorum quadratorum duarum linearum ZH , HA . Sed ex I, 46 summa duorum quadratorum duarum linearum ZH , HA aequalis est quadrato lineae ZD , lineae ZA aequalis; itaque rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum duobus quadratis duarum linearum EH , ZH quadrato lineae ZD aequale erit. Rursus ex I, 46 summa duorum quadratorum duarum linearum HZ , HE quadrato lineae ZE aequalis est; itaque rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum quadrato lineae ZE quadrato lineae ZD aequale erit.

Rursus linea BD in puncto Z in duas partes aequales, in puncto E in duas partes inaequales diuisa ex II, 5 rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae ZE quadrato lineae ZD aequale est; rectangulum igitur duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae ZE rectangulo duabus lineis GE , EA comprehenso cum quadrato lineae ZE aequale erit. Itaque quadrato lineae ZE communi subtracto



١) ! من in margine addita.

للمربع الكائن من خط $\overline{ز د}$ وايضا فبحسب برهان مو من ا فان مجموع المربعين الكائنين من خطي $\overline{ح ز}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ ^(١) فالقائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ج ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ ^(٢) مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز د}$. وايضا فان خط $\overline{ب د}$ قد انقسم بنصفين على نقطة $\overline{ز}$ وبقسامين مختلفين على نقطة $\overline{ه}$ فبحسب برهان $\overline{ه}$ من $\overline{ب}$ فان القائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ مع المربع الكائن ^(٣) من خط $\overline{ز ه}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز د}$ فالقائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ اذن مساو للقائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ج ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ فاذا القينا المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ المشترك بقى القائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ج ه}$ مساويا للقائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ وذلك ما اردنا ان نبين .

وايضا في الصورة الرابعة تقاطع وترا $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ على غير المركز لكن قطع احدهما الآخر بنصفين فننزل ان خط $\overline{ب د}$ قاطع $\overline{ا ج}$ بنصفين على علامة $\overline{ه}$ فاقول ان القائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ا ه}$ $\overline{ج ه}$ [مساو للقائم الزوايا الذي يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ ^(٤) برهانه من اجل ان خط $\overline{ب د}$ قاطع $\overline{ا ج}$ بنصفين على نقطة $\overline{ه}$ فان خط $\overline{ا ج}$ غير مقاطع لخط $\overline{ب د}$ بنصفين لانه قد تبين ببرهان $\overline{د}$ من $\overline{ج}$ ان كل وترين يتقاطعان في دائرة ولا يجوز ان على المركز فليس يقطع كل واحد منهما الآخر بنصفين فخط $\overline{ا ج}$ اذن يقطع خط $\overline{ب د}$ بقسمين مختلفين فلننزل القسم الاعظم خط $\overline{ب ه}$ ونخرج من المركز الذي هم نقطة $\overline{ز}$ عمودا الى خط $\overline{د ب}$ وليكن عمود $\overline{ز ح}$ ونخرج خطوط $\overline{ا ه}$

relinquitur rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum rectangulo duabus lineis BE , ED comprehenso aequale. Q. n. e. d.

Rursus in figura quarta duae chordae AG , BD non in centro inter se secant, sed altera alteram in duas partes aequales secat.

Supponimus, lineam BD [lineam] AG in puncto E in duas partes aequales secare. Dico, rectangulum duabus lineis AE , EG comprehensum [rectangulo duabus lineis BE , ED comprehenso aequale esse].

Demonstratio. Quoniam linea BD [lineam] AG in puncto E in duas partes aequales secat, linea AG lineam BD in duas partes aequales non secabit, quia iam in III, 4 demonstratum est, si duae chordae in circulo inter se secant non per centrum transeuntes, alteram alteram in duas partes aequales non secare; linea AG igitur lineam BD in duas partes inaequales secabit.

Supponamus, maiorem partem esse lineam BE . A centro, quod sit punctum Z . perpendiculari, quae sit ZH , ad lineam DB ducta lineas ZE , ZD , ZA ducimus. Quoniam igitur linea BD in puncto H in duas partes aequales, in puncto E in duas partes inaequales diuisa est, ex II, 5 rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae HE quadrato lineae HD aequale erit. Quadrato lineae ZH communi sumpto rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum duobus quadratis duarum linearum HE , HZ aequale erit summae duorum quadratorum duarum linearum ZH , HD . Sed summa duorum quadratorum duarum linearum ZH , HE quadrato lineae ZE aequalis est; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae EZ aequale erit summae duorum quadratorum duarum linearum ZH , HD . Sed ex I, 46 summa duorum quadratorum duarum linearum ZH , HD aequalis est


¹⁻¹⁾ Haec uerba falso repetita.

¹⁻²⁾ Falso repetita.

³⁾ Uerbis unculis inclusa in codice desunt.

ز د زَا فِين اَجَل ان خط ب د قد انقسم بنصفين على علامة ح
 وبقسمين مختلفين على علامة ه فبحسب برهان ه من ب فان 48 u.
 القائم الزوايا الذى يحيط به خطا ب ه د مع المربع الكائن من
 خط ح ه مساو للمربع الكائن من خط ح د وناخذ مربع خط ز ح
 مشتركا فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا ب ه د مع المربعين
 الكائنين من خطى ح ه ح ز مساو لجميع المربعين الكائنين من
 خطى ح ز ح د لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى ز ح ح ه
 مساو للمربع الكائن من خط ز ه فيكون القائم الزوايا الذى يحيط
 به خطا ب ه د مع المربع الكائن من خط ه ز مساويا لمجموع
 المربعين الكائنين من خطى ز ح ح د لكن بحسب برهان مو من
 ا فان مجموع المربعين الكائنين من خطى ز ح ح د⁽¹⁾ مساو للمربع
 الكائن من خط ا ز المساوى لخط ز د فالقائم الزوايا الذى يحيط به
 خطا ب ه د مع المربع الكائن من خط ز ه اذن مساو للمربع الكائن
 من خط ا ز ومن اجل ان نقطة ه منتصف خط ا ج وقد خرج من
 نقطة ز التى هى المركز اليه خط ز ه فظاهر بحسب برهان ج من ج
 ان زاوية ا ه ز قائمة فمجموع المربعين الكائنين من خطى ز ه ا مساو
 للمربع الكائن من خط ا ز فاذا اسقطنا المربع الكائن من خط ز ه
 المشترك بقى القائم الزوايا الذى يحيط به خطا ب ه د مساويا
 للمربع الكائن من خط ا ه لكن ا ه مساو لخط ه ج فالقائم الزوايا
 الذى يحيط به خطا ب ه د اذن مساو للقائم الزوايا الذى يحيط
 به خطا ا ه ج وذلك ما اردنا ان نبين . وايضا فى الصورة الخامسة
 تقاطع وترا ا ج ب د على نقطة ه وليس واحد منهما يمر بالمركز ولا

quadrato lineae AZ , quae lineae ZD aequalis est; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae ZE aequale est quadrato lineae AZ . Quoniam autem punctum E medium est lineae AG , ad quod a puncto Z , quod centrum est, linea ZE ducta est, ex III, 3 manifestum est, angulum $A EZ$ rectum esse;



itaque summa duorum quadratorum duarum linearum ZE , EA quadrato lineae AZ aequalis est. Quadrato lineae ZE communi subtracto relinquitur rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum quadrato lineae AE aequale. Sed [linea] AE lineae EG aequalis est. Itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum rectangulo duabus lineis AE , EG comprehenso aequale est. Q. n. e. d.

Rursus in figura quinta duae chordae AG , BD in puncto E inter se secant, et neutra earum per centrum transeat nec altera alteram in duas partes aequales secet. Dico, rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum rectangulo duabus lineis AE , EG comprehenso aequale esse.


Demonstratio. Centrum sumimus, quod sit punctum Z , et duabus perpendicularibus ZH , $Z\Theta$ ad duas lineas BD , GA ductis lineas ZA , ZD , ZE ducimus. Manifestum est igitur ex iis, quae supra demonstraui, [lineam] BH lineae HD et lineam $G\Theta$ lineae $A\Theta$ aequalem esse. Iam quoniam linea AG in puncto Θ in duas partes aequales, in puncto E in duas partes inaequales diuisa est, ex II, 5 rectangulum duobus lineis GE , EA comprehensum cum quadrato lineae ΘE quadrato lineae ΘA aequale erit. Quadrato igitur lineae $Z\Theta$ communi sumpto rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum summa duorum quadratorum duarum linearum ΘE , ΘZ aequale erit summae

¹⁾ Librarius uerba falso repetita لكن بحسب برهان deleuit.

أحدهما يقطع الآخر بنصفين فاقول ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب\delta}$ مساو للقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ا\epsilon}$ برهانه انا نستخرج المركز وليكن نقطة $\overline{ز}$ ونخرج عمودى $\overline{زح}$ $\overline{زط}$ الى خطى $\overline{ب\delta}$ $\overline{ج\alpha}$ ونخرج خطوط $\overline{ز\alpha}$ $\overline{ز\delta}$ فظاهر بحسب ما بينا قبل ان $\overline{ب\alpha}$ مساو لخط $\overline{ح\delta}$ وخط $\overline{ج\tau}$ مساو لخط $\overline{ا\tau}$ فمن اجل ان خط $\overline{ا\alpha}$ قد انقسم بنصفين على نقطة $\overline{ط}$ وبقسمين مختلفين على نقطة ϵ فبحسب برهان ϵ من $\overline{ب}$ (1) يكون القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ج\epsilon}$ $\overline{ا\alpha}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ط\epsilon}$ مساويا للمربع الكائن من خط $\overline{ط\alpha}$ فاذا اخذنا المربع الكائن من خط $\overline{ز\tau}$ مشتركاً كان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ج\epsilon}$ $\overline{ا\alpha}$ مع مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ط\epsilon}$ $\overline{ط\tau}$ مساويا لمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ا\tau}$ $\overline{ط\tau}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ط\epsilon}$ $\overline{ط\tau}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز\epsilon}$ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ج\epsilon}$ $\overline{ا\alpha}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز\epsilon}$ مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز\tau}$ $\overline{ط\tau}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز\tau}$ $\overline{ط\tau}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز\delta}$ المساوى لخط $\overline{ز\alpha}$ لان زاوية $\overline{ا\tau\epsilon}$ قائمة وذلك بين ببرهان μ من α فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ج\epsilon}$ $\overline{ا\alpha}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز\epsilon}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز\delta}$ وايضاً فان خط $\overline{ب\delta}$ قد انقسم كما بينا بنصفين على علامة $\overline{ح}$ وبقسمين مختلفين على علامة ϵ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب\delta}$ $\overline{ا\alpha}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ح\epsilon}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ح\delta}$ وناخذ

duorum quadratorum duarum linearum $A\Theta$, ΘZ . Sed summa duorum quadratorum duarum linearum ΘE , ΘZ aequalis est quadrato lineae ZE ; itaque rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum quadrato lineae ZE summae duorum quadratorum duarum linearum $Z\Theta$, ΘA aequale est. Sed summa duorum quadratorum duarum linearum $Z\Theta$, ΘA aequalis est quadrato lineae ZD lineae ZA aequalis, quia angulus $A\Theta Z$ rectus est; quod in I, 46 demonstratum est. Itaque rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum quadrato lineae ZE aequale est quadrato lineae ZD .

Rursus iam demonstratum est, lineam BD in puncto H in duas partes aequales, in puncto E in duas partes inaequales diuisam esse; rectangulum igitur duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae EH quadrato lineae HD aequale est. Quadratum lineae HZ commune sumimus; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum summa duorum quadratorum duarum linearum HE , HZ summae duorum quadratorum duarum linearum ZH , HD aequale est. Sed summa duorum quadratorum duarum linearum HZ , HE quadrato lineae ZE aequalis est; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED cum quadrato lineae ZE summae duorum quadratorum duarum linearum HZ , HD aequale erit. Sed summa duorum quadratorum duarum linearum HZ , HD quadrato lineae ZD aequalis est; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae EZ aequale est quadrato lineae ZD . Sed iam demonstrauius, rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum cum quadrato lineae EZ etiam quadrato lineae ZD aequale esse; itaque quadrato lineae ZE subtracto



¹⁾ من ب in margine additum.


خط $\overline{حز}$ مشتركًا فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مع ^{49 r. 1)} مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ح ه}$ $\overline{ح د}$ مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ح ز}$ $\overline{ح د}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ح ز}$ $\overline{ح ه}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ح ز}$ $\overline{ح د}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ح ز}$ $\overline{ح د}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز د}$ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز د}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ وقد كُنَّا بَيِّنَا ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ج ه}$ $\overline{د ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ مساو ايضا للمربع الكائن من خط $\overline{ز د}$ فاذا اسقطنا المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ بقى القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ج ه}$ $\overline{د ه}$ مساو للقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ وذلك ما اردنا ان نبين وايضا فى الصورة السادسة تقاطع وترا $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ على نقطة $\overline{ه}$ وليس واحد منهما على المركز لكنهما يتقاطعان على زوايا قائمة على نقطة $\overline{ه}$ فاقول ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ا ه}$ $\overline{ج ه}$ مساو للقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ برهانه انا نستخرج مركز الدائرة وليكن نقطة $\overline{ز}$ ونخرج منها الى خطى $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ عمودى $\overline{ز ج}$ $\overline{ز د}$ فظاهر انهما يقسمان خطى $\overline{ا ج}$ $\overline{ب د}$ كل واحد منهما بنصفين فخط $\overline{ب د}$ قد انقسم بنصفين على نقطة $\overline{ح}$ وبقسامين مختلفين على نقطة $\overline{ه}$ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مع المربع الكائن

¹⁾ In codice 50 r., nam ordo duorum foliorum 49 et 50 mutatus est.

relinquitur rectangulum duabus lineis GE , EA comprehensum rectangulo duabus lineis BE , ED comprehenso aequale. Q. n. e. d.

Rursus in figura sexta duae chordae AG , BD in puncto E inter se secant et neutra earum per centrum ducta est, sed ad rectos angulos in puncto E inter se secant. Dico, rectangulum duabus lineis AE , EG comprehensum aequale esse rectangulo duabus lineis BE , ED comprehenso.

Demonstratio. Centrum circuli sumimus, quod sit punctum Z , et ab eo ad duas lineas AG , BD duas perpendiculares ducimus ZH , ZO ; manifestum igitur est, eas duas lineas AG , BD in binas partes secare. Itaque linea BD in puncto H in duas partes aequales, in puncto E in duas partes inaequales diuisa est; rectangulum igitur duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae HE quadrato lineae HD aequale est. [Quadrato] lineae ZH communi sumpto rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum duobus quadratis duarum linearum HE , HZ aequale erit summae duorum quadratorum duarum linearum ZH , HD . Sed summa duorum quadratorum duarum linearum ZH , HE aequalis est quadrato lineae ZE ; itaque rectangulum duabus lineis BE , ED comprehensum cum quadrato lineae ZE summae duorum quadratorum duarum linearum ZH , HD aequale est. Sed summa duorum quadratorum duarum linearum ZH , HD aequalis est quadrato lineae ZG , quae lineae ZD aequalis est; nam angulus ZHD rectus est. Et simili ratione demonstratur, rectangulum duabus lineis AE , EG comprehensum cum quadrato lineae ZE aequale esse quadrato lineae ZG ; itaque rectangulum duabus lineis AE , EG comprehensum cum quadrato lineae ZE aequale erit rectangulo duabus lineis BE , ED comprehenso cum quadrato lineae ZE . Quadrato lineae ZE subtracto relinquitur rectangulum duabus li-



من خط $\overline{ح ه}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ح د}$ فاذا اخذنا خط $\overline{ز ح}$ مشتركاً كان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ح ه}$ $\overline{ح ز}$ مساوياً لمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز ح}$ $\overline{ح د}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز ح}$ $\overline{ح ه}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز ح}$ $\overline{ح د}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز ح}$ $\overline{ح د}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز ح}$ المساوى لخط $\overline{ز د}$ لأن زاوية $\overline{ز ح د}$ قائمة وبمثل هذا البرهان يتبين ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ا ه}$ $\overline{ه ج}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز ح}$ فيكون القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ا ه}$ $\overline{ه ج}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ه ز}$ مساوياً للقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ه ز}$ فاذا اسقطنا المربع الكائن من خط $\overline{ه ز}$ بقى القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب ه}$ $\overline{د ه}$ مساوياً للقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ا ه}$ $\overline{ه ج}$ وذلك ما اردنا ان نبين .:

الشكل الخامس والثلثون من المقالة الثالثة

كل علامة مفروضة خارج دائرة يخرج منها خطان مستقيمان احدهما يقطع الدائرة والاخر يماسها فان السطح القائم الزوايا الذى يحيط به الخط القاطع للدائرة وقسمه الذى يقع خارج الدائرة مساو للمربع الكائن من الخط المماس للدائرة وهذا ينقسم الى 49 u.

neis BE , ED comprehensum aequale rectangulo duabus lineis AE , EG comprehenso. Q. n. e. d.

Propositio XXXV libri tertii.

Si a puncto extra circulum dato duae lineae rectae ducuntur, quarum altera circulum secat, altera eum contingit, rectangulum comprehensum linea circulum secanti et ea parte eius, quae extra circulum cadit, quadrato lineae circulum contingentis aequale erit. Et haec [propositio] in tres casus diuiditur, cum recta secans aut per centrum ducitur aut per semicirculum inter centrum rectamque circulum contingentem positum aut per alterum semicirculum.

Exemplificatio. Supponimus, circulum AB primo modo positum esse, et extra eum datum esse punctum D , a quo ad circulum duae lineae ductae sint, quarum altera eum secet et per centrum eius ducta ad ambitum perueniat, scilicet linea DGB , altera eum in puncto A contingat, scilicet linea DA . Dico igitur, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum quadrato lineae AD aequale esse.

Demonstratio. Supponimus, centrum circuli esse punctum E . [Linea] EA ducta ex III, 17 manifestum est, angulum DAE rectum esse; nam datum est, lineam AD circulum in puncto A contingere, et a puncto A ad centrum circuli linea AE ducta est; quare ea ad lineam AD perpendicularis est ex I, 46. Itaque summa duorum quadratorum duarum linearum AD , AE quadrato lineae DE aequalis est. Et quoniam linea BG in puncto E in duas partes aequales diuisa est, et linea GD ei adiecta est, ex [II, 6] rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae GE quadrato lineae ED aequale erit. Sed iam demonstrauius, quadratum lineae DE summae duorum quadratorum duarum linearum DA , AE aequale esse; itaque rectangu-

ثلاثة اوضاعٍ اما ان يكون وضع الخط القاطع على مركز الدائرة واما ان يكون في النصف الذى بين المركز وبين الخط المماس للدائرة واما ان يكون في النصف الاخر مثاله انا نُنزل دائرة \overline{AB} على الوضع الاول ونُنزل ان خارجاً منها علامة \overline{D} وقد خرج منها الى الدائرة خطان احدهما يقطعها ويجوز على¹⁾ مركزها وينتهى الى محيطها وهو خط \overline{DGB} والاخر يماسها على نقطة \overline{A} وهو خط \overline{DA} فاقول ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا \overline{BD} \overline{DG} مساو للمربع الكائن من خط \overline{AD} برهانه انا نُنزل ان مركز الدائرة علامة \overline{E} ونُخرج \overline{EA} فظاهر بحسب برهان يز من \overline{D} ان زاوية \overline{DAE} قائمة وذلك لان خط \overline{AD} فرض مُماساً للدائرة على نقطة \overline{A} وقد خرج من نقطة \overline{A} الى مركز الدائرة خط \overline{AE} فهو اذن عمود على خط \overline{AD} بحسب برهان مو من ا فان مجموع المربعين الكائنين من خطى \overline{AD} \overline{AE} مساو للمربع الكائن من خط \overline{DE} ومن اجل ان خط \overline{BD} قد قُسم بنصفين على نقطة \overline{E} وزيد في طوله خط \overline{DE} فانه بحسب برهان [و] من [ب] يكون القائم الزوايا الذى يحيط به خطا \overline{BD} \overline{DG} مع المربع الكائن من خط \overline{DE} مساوياً للمربع الكائن من خط \overline{DE} وقد كُنّا بيّنا ان المربع الكائن من خط \overline{DE} مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى \overline{DA} \overline{AE} فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا \overline{BD} \overline{DG} مع المربع الكائن من خط \overline{DE} مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى \overline{DA} \overline{AE} لكن المربع الكائن من خط \overline{AE} مساو²⁾ للمربع الكائن من خط \overline{DE} فاداً

¹⁾ In margine additum.

²⁾ Librarius scripsit, deinde deleuit: لمجموع

اسقطنا هما من الجهتين^{١)} بقى القائم الزوايا الذى يحيط به خطاب $\overline{د}$ مساوياً للمربع الكائن من خط $\overline{اد}$ وذلك ما اردنا ان نبين .
وايضاً فانا نُنزل دائرة $\overline{اب}$ على الوضع الثانى وان علامة $\overline{د}$ مفروضة خارجها وقد خرج منها خط $\overline{دج}$ يقطع الدائرة وينتهى الى اخصيها وخط $\overline{اد}$ يماسها على نقطة $\overline{ا}$ فاقول ان القائم الزوايا الذى يحيط به خط $\overline{ب د}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{اد}$ ببرهانه
انا نستخرج مركز^{٢)} الدائرة كما بين ببرهان $\overline{ا}$ من $\overline{ج}$ ونخرج خطوط $\overline{د ه}$ $\overline{ه ا}$ $\overline{ه ج}$ ونخرج من نقطة $\overline{ه}$ الى خط $\overline{ج ب}$ عمود $\overline{ه ز}$ كما بين اخراجه ببرهان يب من $\overline{ا}$ فظاهراً بما بين ببرهان $\overline{ج}$ من $\overline{ان}$ خط $\overline{ه ز}$ يقسم خط $\overline{ب ج}$ بنصفين نخط $\overline{ب ج}$ قد انقسم على نقطة $\overline{ز}$ بنصفين وقد زيد في طوله خط $\overline{ج د}$ فبين ببرهان $\overline{و}$ من $\overline{ب}$ ان القائم الزوايا الذى يحيط به خط $\overline{ب د}$ مساو مع المربع الكائن من خط $\overline{ج ز}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ز د}$ فاذا اخذنا المربع الكائن من خط $\overline{ز ه}$ مشتركاً كان القائم الزوايا الذى يحيط به خط $\overline{ب د}$ مساو مع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ج ز}$ $\overline{ز ه}$ مساوياً للمربعين الكائنين من خطى $\overline{ز د}$ $\overline{ز ه}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز د}$ $\overline{ز ه}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ه ج}$ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خط $\overline{ب د}$ مساو مع المربع الكائن من خط $\overline{ه ج}$ مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز د}$ $\overline{ز ه}$ لكن مجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ز د}$ $\overline{ز ه}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ه د}$ وذلك بين ببرهان

^{١)} Uerba quae sunt الجهتين in margine addita.


^{٢)} In margine additum.

itaque rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG quadrato lineae ED aequale est. Et quoniam linea AD circulum AB in puncto A contingit, et a puncto A ad centrum ad angulos rectos ducta est linea AE , ex III, 17 angulus DAE rectus est; itaque ex I, 46 summa duorum quadratorum duarum linearum DA , AE quadrato lineae ED aequalis erit. Sed iam demonstrauius, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale esse quadrato lineae DE ; itaque rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale est summae duorum quadratorum duarum linearum EA , AD . Quoniam uero linea EA lineae EG aequalis est, duo quadrata harum duarum inter se aequalia sunt. Quibus duobus utrimque subtractis relinquitur rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum quadrato lineae AD aequale.

Q. n. e. d.

Rursus supponimus, circulum AB tertio modo positum esse, et extra eum datum esse punctum D , a quo ad circulum duae lineae DGB , DA ducantur, quarum linea DBG eum secet et ad concuam partem producta ad punctum B perueniat, linea DA autem eum in puncto A contingat. Dico, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum quadrato lineae AD aequale esse.


Demonstratio. Centro sumpto, quod sit punctum E , et lineis DE , EG , EA ductis a puncto E lineam EZ ita ducimus, ut lineam BG ad rectos angulos secet; ex III, 3 igitur manifestum est, eam illam in duas partes aequales secare. Itaque BG in puncto Z in duas partes aequales diuisa, et in ea producta adiecta est linea GD ; ex III, 6 igitur rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae GZ quadrato li-



مو من ا لان زاوية هـ ذ قائمة فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا 50 r.¹⁾
 بـ دـ جـ مع المربع الكائن من خط هـ جـ اذن مساو للمربع الكائن
 من خط هـ دـ ومن اجل ان خط اـ دـ يماس دائرة اـ بـ على نقطة اـ وقد
 خرج من نقطة اـ الى المركز خط اـ هـ على زوايا قائمة فبحسب برهان
 يز من جـ فان زاوية دـ اـ هـ قائمة وبحسب برهان مو من اـ يكون مجموع
 المربعين الكائنين من خطى دـ اـ هـ مساو للمربع الكائن من خط
 هـ دـ وقد كنا بينا ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا بـ دـ جـ مع
 المربع الكائن من خط هـ جـ مساو للمربع الكائن من خط دـ هـ فالقائم
 الزوايا الذى يحيط به خطا بـ دـ جـ مع المربع الكائن من خط هـ جـ
 اذن مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطى هـ اـ دـ ومن اجل
 ان خط هـ اـ مساو لخط هـ جـ فان مربعيهما متساويان فاذا اسقطناهما
 من الجهتين بقى القائم الزوايا الذى يحيط به خطا بـ دـ جـ مساويا
 للمربع الكائن من خط اـ دـ وذلك ما اردنا ان نبين . وايضا فانا
 نُنزل ان دائرة اـ بـ على الوضع الثالث ونقطة دـ خارجة عنها وقد
 خرج منها الى الدائرة خط [اـ] دـ جـ دـ اـ اما خط دـ جـ فانه يقطعها
 وينتهى الى اخصها الى نقطة بـ واما خط دـ اـ فيماسها على نقطة اـ
 فاقول ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا بـ دـ جـ مساو للمربع
 الكائن من خط اـ دـ برهانه انا نستخرج المركز وليكن نقطة هـ
 ونخرج خطوط دـ هـ جـ هـ اـ ونخرج من نقطة هـ خط هـ ز ونقسم خط بـ جـ
 على زوايا قائمة فبين بحسب برهان جـ من جـ انه نقسمه بنصفين
 نخط بـ جـ قد انقسم بنصفين على نقطة ز وقد زيد في طوله خط

¹⁾ In codice f. 49.

neae ZD aequale erit. Linea ZE communi sumpta rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum summa duorum quadratorum duarum linearum GZ , ZE summae duorum quadratorum duarum linearum ZE , ZD aequale est. Sed ex I, 46 summa duorum quadratorum duarum linearum ZE , ZD quadrato lineae ED aequalis est, quia angulus EZD rectus est [et summa quadratorum linearum GZ , ZE quadrato GE aequalis est]; itaque rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG quadrato lineae ED aequale erit. Uerum etiam summa duorum quadratorum duarum linearum EA , AD quadrato lineae ED aequalis est; et quae eidem rei aequalia sunt, inter se aequalia sunt; itaque summa duorum quadratorum duarum linearum EA , AD aequalis est rectangulo duabus lineis BD , DG comprehenso cum quadrato lineae EG . Et quoniam linea EG lineae EA aequalis est, duo quadrata harum duarum inter se aequalia sunt.



Quibus duobus utrimque subtractis relinquitur rectangulum duabus rectis BD , DG comprehensum quadrato lineae AD aequale. Q. n. e. d.

Propositio XXXVI libri tertii.

Si a puncto extra circulum dato ad circulum duae lineae rectae ducuntur, quarum altera circulum secans ad concavam partem eius peruenit, altera ad partem conuexam modo addidit, et spatium linea secanti et parte eius extra circulum posita comprehensum quadrato lineae ad partem conuexam circuli addidentis aequale est, linea ad circulum addidens circulum continget.

Ad primam figuram trium antecedentium rediens sic dico: Quoniam punctum D extra circulum AD [scr. AB] positum est,

جد فبحسب برهان و من ب فان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا
 بد دج مع المربع الكائن من خط جز مساو للمربع الكائن من
 خط زد فاذا اخذنا خط زه مشتركاً كان القائم الزوايا الذى يحيط
 به خطا بد دج مع مجموع المربعين الكائنين من خطى جز زه
 مساوياً لمجموع المربعين الكائنين من خطى زه زد لكن بحسب
 برهان مو من ا يكون مجموع المربعين الكائنين من خطى زه زد
 مساوياً للمربع الكائن من خط هـ لان زاوية هـ ز د قائمة فالقائم
 الزوايا الذى يحيط به خطا بد دج مع المربع الكائن من خط
 هـ ج مساو للمربع الكائن من خط هـ د ومجموع المربعين الكائنين
 من خطى هـ ا د ايضاً مساو للمربع الكائن من خط هـ د والمساوية
 لشئ واحد فهى متساوية فمجموع المربعين الكائنين من خطى هـ ا
 د مساو للقائم الزوايا الذى يحيط به خطا بد دج مع المربع
 الكائن من خط هـ ج ومن اجل ان خط هـ ج مساو لخط هـ ا فان
 مربعيهما متساويان فاذا اسقطناهما من الجهتين بقى القائم الزوايا
 الذى يحيط به خطا بد دج مساوياً للمربع الكائن من خط ا د
 وذلك ما اردنا ان نبين .

الشكل السادس والثلاثون من المقالة الثالثة

كل علامة مفروضة خارج دائرة يخرج منها الى الدائرة خطان
 مستقيمان احدهما يقطع الدائرة وينتهى الى اخصها والاخر يلقي
 تقبيبها فقط وكان السطح الذى يحيط به الخط القاطع وقسمه
 الخارج من الدائرة مساوياً للمربع الكائن من الخط الملاقى


et ab eo duae lineae ductae sunt, quarum altera ut linea DGB posita circulum secat, altera ut linea AD posita ad conuexam partem eius ad punctum A addidit, et rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum aequale est quadrato lineae AD , linea AD circulum AB in puncto A contingit.

Demonstratio. Lineam AE ducimus. Quoniam linea BG in puncto E in duas partes aequales diuisa est, et in ea producta adiecta est linea GD , rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale erit quadrato lineae ED . Sed quadratum lineae EG aequale est quadrato lineae EA , et rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum aequale est quadrato lineae DA ; itaque rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale erit summae duorum quadratorum duarum linearum EA , AD . Sed iam demonstrauius, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale esse quadrato lineae ED ; itaque quadratum lineae ED aequale est summae duorum quadratorum duarum linearum AE , AD . Uerum in triangulo si summa duorum quadratorum duarum linearum angulum aliquem eius comprehendunt aequalis est quadrato lineae huic angulo oppositae, hic angulus rectus est; quod ex I, 47 manifestum est; itaque angulus EAD rectus. Uerum omnes lineae, quae a termino diametri circuli ad angulos

rectos ducuntur, circulum contingunt; quod ex III, 15 manifestum est. Ergo linea AD circulum AB in puncto A contingit. Q. n. e. d.

Iam uero ad eam formam reuertamur, quae in secunda figura descripta est.

Dico igitur: Si rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum aequale est quadrato lineae AD , angulus DAE rectus est.





لتقريب الدائرة فان الخط الملاقى للدائرة مماساً للدائرة ونُعَيِّد
 الصورة الاولى من الصُور الثلاث المتقدمة فاقول اذا كانت نقطة د
 خارجة من دائرة ا د وخرج منها خطان احدهما كخط د ج ب وهو
 يقطع الدائرة والاخر كخط ا د ينتهي الى تقبيبها الى نقطة ا وكان
 القائم الزوايا الذي يحيط به خطا ب د د ج مساوياً للمربع الكائن
 من خط ا د فان خط ا د يماس دائرة ا ب على نقطة ا برهانه انا 50 u.
 نصل خط ا ه فين اجل ان خط ب ج قد انقسم بنصفين على نقطة
 ه وزيد في طوله خط ج د فان القائم الزوايا الذي يحيط به خطا
 ب د د ج مع المربع الكائن من خط ه ج مساو للمربع الكائن من
 خط ه د لكن مربع خط ه ج مساو لمربع خط ه ا والقائم الزوايا الذي
 يحيط به خطا ب د د ج مساو للمربع الكائن من خط د ا فالقائم الزوايا
 الذي يحيط به خطا ب د د ج مع المربع الكائن من خط ه ج مساو
 لمجموع المربعين الكائنين من خطي ه ا ا د وقد كنا بينا ان
 القائم الزوايا الذي يحيط به خطا ب د د ج مع المربع الكائن من
 خط ه ج مساو للمربع الكائن من خط ه د فالمربع الكائن من خط
 ه د اذن مساو لمجموع المربعين الكائنين من خطي ا ه ا د وكل
 مثلث يكون مجموع المربعين الكائنين من الخطين اللذين يحيطان
 باحد زواياه مساوياً لمربع الخط الذي يوتر تلك الزاوية فان تلك
 الزاوية قائمة وذلك يبين ببرهان مز من ا فزاوية ه ا د اذن قائمة
 وكل خط يخرج من طرف قطر دائرة على زوايا قائمة فان ذلك
 الخط مماس للدائرة وذلك يبين ببرهان مز من ج فخط ا د اذن
 يماس دائرة ا ب على نقطة ا وذلك ما اردنا ان نبين فلنعد رسم

Demonstratio. Quoniam iam in descriptione figurae secundae demonstratum est, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale esse quadrato lineae ED , et etiam manifestum est, quadratum lineae EG quadrato lineae EA aequale esse, et rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum aequale est quadrato lineae AD , summa duorum quadratorum duarum linearum AD , AE aequalis est quadrato lineae ED . Quare ex eo, quod

in propositione praecedenti demonstrauius, manifestum est, angulum EAD rectum esse. Ergo linea AD circulum AB continget. Q. n. e. d.

Rursus ad descriptionem tertiae figurae rediens dico: Si rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum aequale est quadrato lineae AD , angulus DAE rectus erit.

Demonstratio. Quoniam in descriptione figurae tertiae demonstratum est, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale esse quadrato lineae ED , et quadratum [lineae] EG quadrato lineae EA aequale est, quia inter se aequales sunt, et supposuimus, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum aequale esse quadrato lineae AD , rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale erit summae duorum quadratorum duarum linearum EA , AD . Sed iam demonstrauius, rectangulum duabus lineis BD , DG comprehensum cum quadrato lineae EG aequale esse quadrato lineae ED ; itaque summa duorum



الصورة الثانية كهتيتها فاقول اذا كان القائم الزوايا الذى يحيط به
خطا $\overline{ب د}$ $\overline{د ج}$ مساويا للمربع الكائن من خط $\overline{ا د}$ فان زاوية $\overline{د ا ه}$
قائمة برهانه من اجل ان في رسم الصورة الثانية قد تبين ان القائم
الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب د}$ $\overline{د ج}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ه ج}$
مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ه د}$ وظاهر ايضا ان المربع الكائن
من خط $\overline{ه ج}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ا ه}$ والقائم الزوايا الذى
يحيط به خطا $\overline{ب د}$ $\overline{د ج}$ مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ا د}$ فمجموع
المربعين الكائنين من خطى $\overline{ا ه}$ $\overline{ا د}$ مساو للمربع الكائن من خط
 $\overline{ه د}$ فبتين بحسب ما بينا في الشكل المتقدم ان زاوية $\overline{ه ا د}$ قائمة فخط
 $\overline{ا د}$ مُسبَّسٌ لدائرة $\overline{ا ب}$ وذلك ما اردنا ان نبين . ونعيد ايضا رسم
الصورة الثالثة فاقول اذا كان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب د}$
 $\overline{د ج}$ مساويا للمربع الكائن من خط $\overline{ا د}$ فان زاوية $\overline{د ا ه}$ قائمة برهانه
من اجل ان في رسم الصورة الثالثة قد تبين ان القائم الزوايا الذى
يحيط به خطا $\overline{ب د}$ $\overline{د ج}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ه ج}$ مساو للمربع
الكائن من خط $\overline{ه د}$ ومربع $\overline{ه ج}$ مساو لمربع خط $\overline{ه ا}$ لانها متساويان
وفرضنا على ان القائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب د}$ $\overline{د ج}$ مساو
للمربع الكائن من خط $\overline{ا د}$ فالقائم الزوايا الذى يحيط به خطا $\overline{ب د}$
 $\overline{د ج}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ه ج}$ مساو لمجموع المربعين
الكائنين من خطى $\overline{ا ه}$ $\overline{ا د}$ لكننا قد بينا ان القائم الزوايا الذى
يحيط به خطا $\overline{ب د}$ $\overline{د ج}$ مع المربع الكائن من خط $\overline{ه ج}$ مساو للمربع
الكائن من خط $\overline{ه د}$ فمجموع المربعين الكائنين من خطى $\overline{ا ه}$ $\overline{ا د}$
مساو للمربع الكائن من خط $\overline{ه د}$ فبحسب برهان مز من ا تكون

quadratorum duarum linearum EA , AD quadrato lineae ED aequale est. Quare ex I, 47 angulus EAD rectus est.

Ergo ex III, 5 [scr. 15] linea AD circulum AB in puncto A contingit. Q. n. e. d.

Finis libri tertii libri Euclidis.


Laus Deo, et Muhammedi familiaeque eius Deus benedicat eosque salutet!



زاوية هـ قائمة وبحسب برهان هـ من ج فان خط آد مماس لدائرة
أب على نقطة آ وذلك ما اردنا ان نبين .∴

تمت المقالة الثالثة من كتاب اوقليدس والحمد لله وصلى
الله على محمد وآله وسلّم .∴





**DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARD**



